

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。

第2類医薬品

販売名：神農柴胡桂枝湯エキス錠

漢方製剤

⚠ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
そ の 他	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

まれに下記の重篤な症状が起ることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位(かぜの中期から後期の症状の場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(効能・効果) 体力中等度又はやや虚弱で、多くは腹痛を伴い、ときに微熱・寒気・頭痛・はきけなどのあるもの次の諸症：胃腸炎、かぜの中期から後期の症状

(用法・用量) 次の量を食前又は食間に水又はお湯にて服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	4錠	3回
7才以上15才未満	3錠	
5才以上7才未満	2錠	
5才未満	服用しないこと	

(用法・用量に関連する注意)

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 食間とは食後2~3時間を指します。

(成分・分量) 12錠中 柴胡桂枝湯エキス(3/5量) 2.28gを含有しています。
 (日局サイコ 3.0g、日局ハンゲ 2.4g、日局ケイヒ 1.5g、日局ジャクヤク 1.2g、日局オウゴン 1.2g、日局ニンジン 1.2g、日局タイソウ 1.2g、日局カンゾウ 0.9g、日局ショウキョウ 0.6gに相当)
 添加物：無水ケイ酸、ケイ酸Al、C-MC-Ca、ステアリン酸Mg、乳糖水和物

(保管及び取扱い上の注意) (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをよく閉めて保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(傾用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4)本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を原料として使用していますので、製品により色調等が異なることがあります。効能・効果には変わりありません。(5)本剤をぬれた手で扱わないでください。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じることがあります。(6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。(上段)使用期限(西暦年、月)/(下段)製造番号

製 造 ジェーピーエス製薬株式会社
 販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

お客様相談室 ☎045-593-2136

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

