

漢方製剤

第2類医薬品

さいこせいかんとう
柴胡清肝湯エキス〔細粒〕25

本方は、かんが強いタイプで、扁桃腺炎にかかりやすい、湿疹などが出やすいといった腺病体質の小児に奏効します。

 **• 使用上の注意 •**

本剤は小児用ですが、柴胡清肝湯として定められた一般的な注意事項を記載しています。

 **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3)胃腸が弱く下痢しやすい人
- (4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
*腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

5. 本剤の服用により、まれに症状が進行することもありますので、このような場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

***6. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

●効能・効果●

体力中等度で、疳の強い傾向（神経過敏）にあるものの次の諸症：

神経症、慢性扁桃炎、湿疹・皮膚炎、虚弱児の体質改善

●用法・用量●

次の量を食前又は食間に水又は温湯で服用してください。

（食間とは食後2～3時間を指します。）

年 齢	1 回 量		1日服用回数
	分包剤	大入り剤	
15才未満7才以上	1 包	2.0 g	3 回
7才未満4才以上	3/4包	1.5 g	
4才未満2才以上	1/2包	1.0 g	
2才未満	1/3包	0.75 g以下	

〔用法・用量に関連する注意〕

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

●成分・分量●

本品3包(6.0g)又は6.0gは

サイコ	1.0 g	カロコン	0.75 g
トウキ	0.75 g	ハッカ	0.75 g
シャクヤク	0.75 g	カンゾウ	0.75 g
センキュウ	0.75 g	オウレン	0.75 g
ジオウ	0.75 g	オウゴン	0.75 g
レンギョウ	0.75 g	オウバク	0.75 g
キキョウ	0.75 g	サンシシ	0.75 g
ゴボウシ	0.75 g		

上記より製した柴胡清肝湯水製工エキス5.2g（乾燥物換算で約2.6gに相当）を含有する細粒剤です。添加物としてアスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、メタケイ酸アルミン酸Mg、ヒプロメロース、乳糖、デキストリン、トウモロコシデンプン、香料を含有します。

●保管及び取扱い上の注意●

(1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）

(4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがありますが、効果には変わりありません。

(5)分包剤で1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。

(6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

●お問い合わせ先●

松浦薬業株式会社 お客様相談窓口

TEL (052)883-5172 受付時間 10：00～17：00（土・日・祝日を除く）

製造販売元

 **松浦薬業株式会社**
名古屋市昭和区円上町24-21