

## 強 清 肝 散

第2類医薬品

## ⚠ 使用上の注意



## 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。
    - むくみ
  - 次の診断を受けた人。
    - 高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状        |
|------|------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ  |
| 消化器  | 食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称               | 症 状   |
|---------------------|---|
| 偽アルドステロン症、<br>ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| 腸間膜静脈硬化症            | 長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。               |

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 本剤の服用により、まれに症状が進行することもあるので、このような場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 効能・効果

肝臓疾患、胃病

## 用法・用量

次の量を食前又は食間<sup>注)</sup>に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

注)「食間」とは食後2～3時間を指します。

| 年 齢        | 1 回量            |        | 1 日服用回数 |
|------------|-----------------|--------|---------|
|            | 容器入りの場合         | 分包品の場合 |         |
| 大 人        | 1.5g(添付のサジ1杯)   | 1 包    | 3 回     |
| 12歳以上15歳未満 | 大人の2/3の量(1.0 g) | 2/3包   |         |
| 7歳以上12歳未満  | 大人の1/2の量(0.75g) | 1/2包   |         |
| 4歳以上 7歳未満  | 大人の1/3の量(0.5 g) | 1/3包   |         |
| 4 歳未満      | 服用しないこと         |        |         |

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

## 成分・分量

本剤4.5g又は3包中

キキョウ……………0.141g } エキス……………0.851mL(固形物として0.028g)  
レンギョウ……………0.141g }

カロコン0.352g トウキ0.352g }  
キキョウ0.352g ハツカ0.352g } エキス……………2.250mL(固形物として0.042g)  
ジオウ0.352g レンギョウ0.352g }  
シャクヤク0.352g ゴボウシ0.352g }  
センキュウ0.352g }

オウゴン末……………0.633g  
オウバク末……………0.633g  
オウレン末……………0.633g  
カンゾウ末……………1.054g  
サンシシ末……………0.633g  
サイコ末……………0.844g

- ・本剤は黄褐色で、特異なにおいを有し、味は苦い散剤です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがあります、効果に変わりはありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 分包品において1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

強清肝散は生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤のことをご理解いただいている医師、薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

### お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記をお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元

剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号