

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。  
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管して下さい。

# 東洋の柴苓湯

(さいれいとう)

第2類医薬品

本剤は、漢方の古典「本朝経験方」に収載されている柴苓湯に準拠して製造された煎薬用の紙パック剤です。

## 使用上の注意

### X してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)  
次の人は服用しないこと  
生後3ヶ月未満の乳児。



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (6) 次の症状のある人。 : むくみ
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (7) 次の診断を受けた人。 : 高血圧、心臓病、腎臓病
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 高齢者。
- (5) 今までに薬などにより発疹・発赤・かゆみ等を起こしたことがある人。

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオバチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

#### 3. 1カ月位（急性胃腸炎に服用する場合には5～6回、水瀉性下痢、暑気あたりに服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

#### 4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 【効能・効果】

吐き気、食欲不振、のどのかわき、排尿が少ないなどの次の諸症：

水瀉性下痢、急性胃腸炎、暑気あたり、むくみ

### 【用法・用量】

大人（15才以上）は1包（1日量）につき水800mLを加えて約半量になるまで煮詰め、紙袋とともに煎じかすを取り去り、煎液を食前又は食間2回に分けて服用して下さい。小兒（15才未満）は同様に煎じ、下記の量を食前又は食間2回に分けて服用して下さい。

年齢	1包(1日量) 煎じ液	1日 服用回数	年齢	1包(1日量) 煎じ液	1日 服用回数
大人（15才以上）	全量	2回に 分けて	4才未満 2才以上	1/3量	2回に
15才未満 7才以上	2/3量	分けて	2才未満	1/4量	分けて
7才未満 4才以上	1/2量				

### 【用法・用量に関する注意】

- (1) 小兒に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させること。
- (3) 用法・用量を厳守すること。

### 【成分・分量】

日本薬局方 サイコ	7.0g	日本薬局方 カンゾウ	2.0g
日本薬局方 ハンゲ	5.0g	日本薬局方 タクシヤ	5.0g
日本薬局方 ショウキヨウ	1.0g	日本薬局方 チヨレイ	3.0g
日本薬局方 オウゴン	3.0g	日本薬局方 ブクリヨウ	3.0g
日本薬局方 タイソウ	3.0g	日本薬局方 ソウジユツ	3.0g
日本薬局方 ニンジン	3.0g	日本薬局方 ケイヒ	2.0g

### 保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管すること。

(2) 小兒の手のとどかない所に保管すること。

(3) 調用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。

(4) 煎じ葉は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用すること。



### 【問い合わせ先】

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申上げます。

東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0120-00-1040

受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
電話 0120-149-931

販売元 東洋漢方製薬株式会社

〒584-0022 大阪府富田林市中野町東2丁目1番16号