



4 987438 866643

切り口

切り口

開封後はチャックを閉めて保管してください。

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。



販売名：JPS酸棗仁湯エキス錠N

漢方製剤

第2類医薬品

## 使用上の注意



## 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 胃腸の弱い人。(4) 下痢又は下痢傾向のある人。 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください〔消化器〕吐き気、食欲不振、胃部不快感 3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢 4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

**効能・効果** 体力中等度以下で、心身が疲れ、精神不安、不眠などがあるものの次の諸症：不眠症、神経症

**用法・用量** 次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。成人(15才以上)1回3錠、7才以上15才未満 1回2錠、7才未満 服用しないこと 〈用法・用量に関連する注意〉(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。(2) 食間とは食後2～3時間を指します。

**成分・分量** 9錠中 酸棗仁湯乾燥エキス散2.28g〔日局サンソウニン 9.0g、日局チモ 1.8g、日局センキュウ 1.8g、日局ブクリョウ 3.0g、日局カンゾウ 0.6g に相当〕 添加物：二酸化ケイ素、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、乳糖水和物

**保管及び取扱い上の注意** (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをよく閉めて保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4) 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を原料として使用していますので、製品により色調等が異なることがありますが、効能・効果には変わりありません。(5) 本剤をぬれた手で扱わないでください。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じることがあります。(6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

(上段)使用期限(西暦年、月)/(下段)製造番号



T1-21071

ジェーピーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

発売元 横浜市都筑区東山田4-42-22

お客様相談室 ☎045-593-2136

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。

第2類医薬品

販売名：JPS酸棗仁湯エキス錠N

漢方製剤

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 胃腸の弱い人。(4) 下痢又は下痢傾向のある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、心身が疲れ、精神不安、不眠などがあるものの次の諸症：  
不眠症、神経症

〔用法・用量〕 次の量を食前又は食間に水又はお湯にて服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	3錠	3回
7才以上15才未満	2錠	
7才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 食間とは食後2～3時間を指します。

〔成分・分量〕 9錠中 酸棗仁湯乾燥エキス散2.28gを含有しています。

〈原生薬換算量〉

〔サンソウニン 9.0g、チモ 1.8g、センキュウ 1.8g、ブクリョウ 3.0g、カンゾウ 0.6g〕

添加物：二酸化ケイ素、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、乳糖水和物

〔保管及び取扱い上の注意〕 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをよく閉めて保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4) 本剤をぬれた手で扱わないでください。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じることがあります。(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

(上段)使用期限(西暦年、月)/(下段)製造番号

製 造 **ジェーピーエス製薬株式会社**  
販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

お客様相談室 ☎ 045(593)2136

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931





第2類医薬品

切り取り線 

疲れ、ストレス などで  
眠れない方

# 不眠症・神経症

心身が疲れ眠れない方

5つの  
生薬配合



眠りを助ける漢方薬

体力中等度以下で、心身が疲れ、精神不安、不眠などがある方に



.....切り取り線



↓開封後はチャックを閉めて保管してください。



服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。

第2類医薬品

販売名：JPS酸棗仁湯エキス錠N

漢方製剤

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 胃腸の弱い人。(4) 下痢又は下痢傾向のある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、心身が疲れ、精神不安、不眠などがあるものの次の諸症：不眠症、神経症

〔用法・用量〕 次の量を食前又は食間に水又はお湯にて服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	3錠	3回
7才以上15才未満	2錠	
7才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 食間とは食後2～3時間を指します。

〔成分・分量〕 9錠中 酸棗仁湯乾燥エキス散2.28gを含有しています。

〈原生薬換算量〉

〔サンソウニン 9.0g、チモ 1.8g、センキュウ 1.8g、ブクリョウ 3.0g、カンゾウ 0.6g〕

添加物：二酸化ケイ素、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、乳糖水和物

〔保管及び取扱い上の注意〕 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをよく閉めて保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4) 本剤をぬれた手で扱わないでください。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じることがあります。(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

製造 株式会社ジェーピーエス製薬株式会社  
販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

お客様相談室 ☎ 045-593-2136

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931