

本剤は、漢方製剤酸棗仁湯のエキス製剤で、心身が疲れて眠れない場合に用いると効果があります。精神的に色々な苦痛や訴えが多く、又身体が疲れ弱って眠れない場合に漢方成分がやさしく効きます。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

本剤を服用している間は、他の鎮静薬を服用しないでください。

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 胃腸の弱い人。(4) 下痢又は下痢傾向のある人。(5) 高齢者。(6) むくみの症状のある人。(7) 高血圧、心臓病、腎臓病の診断を受けた人。

2. 服用後、消化器部に吐き気、食欲不振、胃部不快感の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 次の場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 服用後、下痢の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合。(2) 1週間位服用しても症状がよくならない場合。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

● 成分・分量 (12錠中)

サンソウニン(酸棗仁) ······	10,000 mg	ブクリョウ(茯苓) ······	5,000 mg
チモ(知母) ······	3,000 mg	カンゾウ(甘草) ······	1,000 mg
センキュウ(川芎) ······	3,000 mg	以上より製した酸棗仁湯エキスM ······	2,000 mg
添加物として乳糖水和物、バレイショデンプン、炭酸カルシウム、セルロース、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、ステアリン酸マグネシウムを含有する。			

● 効能

体力中等度以下で、心身が疲れ、精神不安、不眠などがあるものの次の症状：不眠症、神経症

● 用法・用量

大人(15才以上)1回4錠宛 4才以上15才未満 1回2錠宛 1日2~3回食間服用してください。

注意 (1) 小児に服用させる場合は、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(2) 幼児に服用させる場合は薬剤がのどにつかえることのないよう注意してください。

● 保管及び取扱い上の注意

(1) 高温・直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。(3) 調用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。(4) 本品は生薬製剤のため、錠剤表面の色が一定でない場合や僅かに斑点を認める場合がありますが、品質に関係ないので、安心して服用してください。(5) 外箱に表示した使用期限内に服用してください。

発売元  日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元 米田薬品工業株式会社

奈良県高市郡高取町市尾986

本品についてのお客様相談室 TEL 0744-52-3720

お問合せ先：月～金曜日 10:00～16:00 (祝祭日、特定日を除く)

副作用被害救済制度 TEL 0120-149-931