

この添付文書は、お薬とともに保管し、ご使用の際には、必ずお読み下さい。

【創傷性皮膚疾患用薬】

赤色ワグラス®軟膏 第3類医薬品

- ◆ 赤色ワグラス軟膏は、ひび・あかぎれ・かみそり負けなどの創傷性の皮膚疾患や、血行障害により起こるしもやけ・凍傷など、さらには火傷(やけど)を改善するよう考え出された外用の軟膏剤(塗り薬)です。
- ◆ 赤色ワグラス軟膏中のシコンはトウキとともに新しい皮膚の形成を助け、外傷やただれなどの傷口を治すように働きます。

使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 湿潤・ただれ・やけど・外傷のひどい人。
 - (4) 傷口が化膿している人。
 - (5) 患部が広範囲の人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるため、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

くさ^{a)}、急性・慢性湿疹、おむつかぶれ、しもやけ、股ずれ、かみそり負け、火傷、凍傷、ひび、あかぎれ、外傷、あせも、ただれ、くつずれ

a) くさ：おできや湿疹などの皮膚病のことを示します。

用法・用量

1日2～3回患部に塗布して下さい。滲出物の多い時はガーゼに厚く塗り局部に貼布して下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 外用にのみ使用すること。
- (4) 目に入らないよう注意すること。
- (5) 患部を清潔にしてから使用すること。

成分・分量

本剤2250g中

チコニール(ゴマ油673.3g、ゴマ油・シコン・トウキのゴマ油抽出エキス572.2g)1245.5g

添加物としてミツロウを含有する。

- ・本剤は赤色で、特異なおいを有する軟膏剤です。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
【40℃以上の高温の場所を避けること。晴天の日は自動車内が高温になるので放置しないこと。】
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 有効成分シコンの紫色は染料にも使用される色素です。そのため、衣服やくつ下などに薬剤が付着すると色が落ちにくいので、ご注意下さい。

使用ポイント

ご使用に当たっては下記の事項を参考に塗布するようにして下さい。

かみそり負け ひび、あかざれ	軟膏をうすくすり込んで下さい。
しもやけ 凍傷	皮膚表面がしっかりしている場合は、うすくすり込んで下さい。ただれた状態になっている場合、ガーゼに軟膏を1mm位の厚さに塗って患部に貼って下さい。
おむつかぶれ 股ずれ、ただれ	刺激の少ない消毒剤で患部を消毒した後、ガーゼに軟膏を1mm位の厚さに塗って患部に貼って下さい。
火傷	軟膏を患部へ直接1mm位の厚さに塗って下さい。
外傷	傷口を消毒剤で消毒した後、ガーゼに軟膏を十分のばして患部に貼って下さい。軟膏のついていないガーゼが傷口について傷むことがありますので、軟膏を十分な広さに塗るようにして下さい。
くさ、湿疹 あせも	軟膏をうすくすり込んで下さい。 患部を刺激するためにすり込むことができない場合は、ガーゼに軟膏を1mm位の厚さに塗って患部に貼って下さい。
くつずれ	軟膏を塗った後、ガーゼ等で患部を保護するようにして下さい。

薬と養生

赤色ワグラス軟膏は生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく使用することが大切です。

また、気持ちの持ち方(気の養生)や食生活(食の養生)に注意することも、病気を治すためには大事なことです。

あなたの病気を早く治すため、お薬の使用に際しては、生薬製剤や養生方法の事をご理解いただいている医師やホノミ漢方会々員の薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記をお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号