

第2類医薬品

漢方煎専科

七物降下湯

46

5日分10包



自然のちから、ひとに活かして
株式会社 アキザワ漢方廠

2014年10月(記載要領変更に伴う改訂)

第2類医薬品

漢方薬 七物降下湯 「タキザワ」

17B

△<使用上の注意>



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】	
ジ オ ウ	4.0 g
オ バ ク	2.0 g
ト ウ キ	4.0 g
チ ョウトウコウ	3.0 g
セ シ ュウ	4.0 g
オ ウ ギ	3.0 g
シ ャ ク ヤ ク	4.0 g
1日分 (1包 12.0g × 2)	24.0g

【効能・効果】

体力中等度以下で、顔色が悪くて疲れやすく、胃腸障害のないものの次の諸症：高血圧に伴う随伴症状（のぼせ、肩こり、耳なり、頭重）

【用法・用量】

1日2回朝夕の空腹時に、本品1包（1回分）を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて半量ぐらいまで煎じめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、次の量を服用してください。

年 齢	1回 量
大人（15歳以上）	全量
15歳未満	服用しないこと

※用法・用量を厳守してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



4 974961 180124



製造販売元

株式会社 タキザワ漢方販
さいたま市大宮区堀の内町2丁目623-1
お客様相談室 048-688-7923
受付時間：9時～18時(月～金)

タキザワ漢方

検索

ホームページ:takizawa.asia

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

0120-149-931

