

しちもつこうかとう
七物降下湯エキス〔細粒〕83

本方は、四物湯に釣藤鈎、黄耆、黄柏を加えたもので、特に体力が中等度以下の人で血圧が高く、そのためにのぼせ、肩こり、耳なり、頭重を訴える人によく効きます。

 **・使用上の注意・**

 **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

●効能・効果●

体力中等度以下で、顔色が悪くて疲れやすく、胃腸障害のないものの次の諸症：

高血圧に伴う随伴症状（のぼせ、肩こり、耳なり、頭重）

●用法・用量●

次の量を食前又は食間に水又は温湯で服用してください。
(食間とは食後2～3時間を指します。)

| 年 齢 | 1 回 量 | | 1日服用回数 |
|-----------|-------|---------|--------|
| | 分包剤 | 大入り剤 | |
| 大人(15才以上) | 1 包 | 2.0 g | 3 回 |
| 15才未満7才以上 | 2/3包 | 1.3 g | |
| 7才未満4才以上 | 1/2包 | 1.0 g | |
| 4才未満2才以上 | 1/3包 | 0.7 g | |
| 2才未満 | 1/4包 | 0.5 g以下 | |

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

●成分・分量●

本品3包(6.0g)又は6.0gは

| | | | |
|-------|-------|---------|-------|
| トウキ | 1.5 g | チョウトウコウ | 2.0 g |
| シャクヤク | 1.5 g | オウギ | 1.5 g |
| センキュウ | 1.5 g | オウバク | 1.0 g |
| ジオウ | 1.5 g | | |

上記より製した七物降下湯水製工キス4.8g(乾燥物換算で約2.4gに相当)を含有する細粒剤です。添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、ヒプロメロース、乳糖、結晶セルロース、トウモロコシデンプン、香料を含有します。

●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。
- (5)分包剤で1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

●お問い合わせ先●

松浦薬業株式会社 お客様相談窓口

TEL (052)883-5172 受付時間 10:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元

 **松浦薬業株式会社**
名古屋市昭和区円上町24-21