

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください

第2類医薬品

漢方製剤



販売名：漢方プレッソ 四物湯

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
- (4) 胃腸の弱い人
- (5) 下痢しやすい人
- (6) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、食欲不振、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢

4. 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

体力虚弱で、冷え症で皮ふが乾燥、色つやの悪い体質で胃腸障害のないものの次の諸症：月経不順、月経異常、更年期障害、血の道症^{注)}、冷え症、しもやけ、しみ、貧血、産後あるいは流産後の疲労回復
注)「血の道症」とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである

(裏面につづく)

用法・用量

次の量を食前又は食間に約100mLのお湯を加え、よくかき混ぜて服用してください

年齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	1包	1日2回
15才未満	× 服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること
 - (2) 開封前によく振り、開封後はすみやかに溶かして服用すること
 - (3) そのまま服用しないこと
- 本品は1回1包のみきりなので、分割服用しないこと
 - 分包の開封時に薬液が飛び散らないよう注意すること
 - 食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます



成分・分量 1日量(2包:20g)中

四物湯エキス…10.0g

トウキ ……1.5g	シャクヤク ……1.5g
センキュウ ……1.5g	ジオウ ……1.5g
より抽出	

添加物として、スクラロース、アセスルファムカリウム、エタノール、パラベン、香料を含有する

- 本剤は、天然物(生薬)を用いているため、薬液の色や香り、味が多少異なることがあります
また、溶けにくい場合がありますが、品質に問題ありません

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社**
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **小林製薬株式会社**
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN

10204897