

第2類医薬品



漢方煎専科

四物湯

71

5日分10包



自然のちから、ひとに活かして
株式会社 アキザワ漢方廠

2016年4月(記載要領変更に伴う改訂)

第2類医薬品

漢方薬 四物湯 「タキザワ」

16D

⚠️<使用上の注意>



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
- (4) 胃腸の弱い人
- (5) 下痢しやすい人
- (6) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、食欲不振、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】

トウキ……………5.0g センキュウ……………5.0g
シャクヤク……………5.0g ジオウ……………5.0g
1日分（1包10.0g×2）20.0g

【効能・効果】

体力虚弱で、冷え症で皮膚が乾燥、色つやの悪い体质で胃腸障害のないものの次の諸症：月経不順、月経異常、更年期障害、血の道症（注）、冷え症、しみやけ、しみ、貧血、産後あるいは流産後の疲労回復

（効能・効果に関する注意）

血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

【用法・用量】

1日2回朝夕の空腹時に、本品1包（1回分）を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて半量ぐらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、次の量を服用してください。

年 齢	1回量
大人（15歳以上）	全量
15歳未満	服用しないこと

※用法・用量を厳守してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



4 974961 180186



製造販売元

株式会社 タキザワ漢方廠
さいたま市大宮区堀の内町2丁目623-1
お客様相談室 ☎ 048-688-7923
受付時間：9時～18時（月～金）

タキザワ漢方

検索

ホームページ:takizawa.asia

副作用被害救済制度の問合せ先

（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/camp/index.html>
☎ 0120-149-931

