

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

## 第2類医薬品

# ウチダの漢方製剤

## ウチダの炙甘草湯

シャカンゾウトウ

ウチダの炙甘草湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎剤で、特異な芳香があります。



## 使用上の注意



## 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。
    - むくみ
  - 次の診断を受けた人。
    - 高血圧、心臓病、腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
  - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合
- 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
  - 下痢

## 成分・分量

本品1袋(1日分)中			
ケイヒ	3.0g	ショウキョウ	1.0g
タイソウ	3.0g	マシニン	3.0g
ニンジン	3.0g	シャカンゾウ	3.0g
ジオウ	6.0g	ゼラチン	2.0g (別包)
バクモンドウ	6.0g		
全量		30.0g	

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

## お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141  
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

## 効能・効果

体力がおとろえて、疲れやすいものの動悸、息切れ。

## 用法・用量

年齢	1日量
大人(15歳以上)	1袋(1日分)につき水約600mLを加え、あまり強くない火にかけ約300mLに煮詰め、袋をとり出しゼラチン1包を加えて溶かし、3回に分けて食前1時間又は食間空腹時に温服する。
15歳未満	服用しないこと

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬  
東京都中央区日本橋本町 4-2-8