



中国の民間話「白蛇伝」に登場する女性を伝統的な漢方のイメージとしてシンボルマークとしたものです。

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。また必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

# コムロン®

商品番号

C166

コムロンは、筋肉や手足、消化管（平滑筋）などのけいれん、疼痛に用いられます。急激におこる筋肉のけいれんは各所に痛みをもたらします。こむらがえり、腰痛、腹痛などに効果があり、漢方の鎮痛剤といわれています。



### 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

#### 1. 次の人は服用しないでください

次の診断を受けた人。  
心臓病

#### 2. 症状があるときのための服用にとどめ、連用しないでください



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 次の症状のある人。  
むくみ
- (5) 次の診断を受けた人。  
高血圧、腎臓病

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
うっ血性心不全、心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

#### 3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

## 【効能・効果】

体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症：  
こむらがり、筋肉のけいれん、腰痛、腹痛

## 【用法・用量】

食前または食間に服用してください。  
食間とは……食後2～3時間を指します。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
大人（15歳以上）	1錠	3回
15歳未満	服用しないでください	

## ＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)カプレット(錠剤)の取り出し方

＜カプレットの取り出し方＞

右図のようにカプレットの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、アルミ片を除いて取り出してから服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります）



## 【成分・分量】



成分・分量（本剤3錠中）

シヤクヤク……………2.5g カンゾウ……………2.5g  
より抽出した芍薬甘草湯エキス散（1/2量）1.50gを含有しています。

添加物として含水二酸化ケイ素、クロスカルメロースナトリウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- (4)ぬれた手や湿気を帯びた手で取り扱わないでください。水分は錠剤の色や形が変わる原因になります。
- (5)本剤は吸湿しやすいためアルミ袋に入れてあります。袋を開封後、万一、シートの裏面が破損(あな等)してしまいますと、吸湿して濃褐色に変わることがありますので中身の錠剤が破損しないように、保管及び携帯に注意してください。変色した商品は、服用しないでください。
- (6)使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。
- (7)箱の「開封年月日」記入欄に、内袋(アルミの袋)を開封した日付を記入してください。



湿気注意

本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることがありますが、品質・効果に変わりはありません。

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。  
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室  
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106  
受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

® 登録商標



左のシールをハガキに貼って、お買求めの店名、住所、氏名、年齢、職業、電話番号、症状をお書きそえのうえ、お申込みください。漢方薬と食養を詳しく説明した、パンフレットをお送りいたします。

製造販売元 漢方をよりよく より多くの人に  
 **小太郎漢方製薬株式会社**  
〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号  
TEL 06 (6371) 9106  
<http://www.kotaro.co.jp/>



中国の民間話話「白蛇伝」に登場する女性を伝統的な漢方のイメージとしてシンボルマークとしたものです。

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

**コムロン**<sup>®</sup>

商品番号

L166

コムロンは、筋肉や手足、消化管（平滑筋）などのけいれん、疼痛に用いられます。急激におこる筋肉のけいれんは各所に痛みをもたらします。こむらがえり、腰痛、腹痛などに効果があり、漢方の鎮痛剤といわれています。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

#### 1. 次の人は服用しないでください

次の診断を受けた人。

心臓病

#### 2. 症状があるときのための服用にとどめ、連用しないでください



#### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。

(3) 高齢者。

(4) 次の症状のある人。

むくみ

(5) 次の診断を受けた人。

高血圧、腎臓病

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
うっ血性心不全、 心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

#### 3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

## 【効能・効果】

体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症：  
こむらがり、筋肉のけいれん、腰痛、腹痛

## 【用法・用量】

食前または食間に服用してください。

食間とは……食後2～3時間を指します。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
大人（15歳以上）	1錠	3回
15歳未満	服用しないでください	

## 〈用法・用量に関連する注意〉

(1)定められた用法・用量を厳守してください。

(2)カプレット(錠剤)の取り出し方

右図のようにカプレットの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、アルミ片を除いて取り出してから服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)

〈カプレットの取り出し方〉



## 【成分・分量】

成分・分量（本剤3錠中）

シაკヤク……………2.5g カンゾウ……………2.5g  
より抽出した芍薬甘草湯エキス散（1/2量）1.50gを含有しています。

添加物として含水二酸化ケイ素、クロスカルメロースナトリウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

## 【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。



（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）

(4)ぬれた手や湿気を帯びた手で取り扱わないでください。水分は錠剤の色や形が変わる原因になります。

(5)本剤は吸湿しやすいためアルミ袋に入れてあります。袋を開封後、万一、シートの裏面が破損(あな等)してしまいますと、吸湿して濃褐色に変わることがありますので中身の錠剤が破損しないように、保管及び携帯に注意してください。変色した商品は、服用しないでください。

(6)使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。

(7)箱の「開封年月日」記入欄に、内袋(アルミの袋)を開封した日付を記入してください。



湿気注意

本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることがありますが、品質・効果に変わりはありません。

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室  
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106  
受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

® 登録商標