

HapYcom
ハビコム

足のつり 筋肉のけいれん こむらがえり

漢方製剤
芍薬甘草湯

対象年齢 5歳以上

内容量 60錠

第2類医薬品

原寸大

商品番号 A166

※分量処方とは
漢方処方の出典に基づく
生薬量を用いたもの。

切り取り線
吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりしめること。 **漢方製剤**

服用に際してはこの説明文を必ずお読みください。 **第2類医薬品**

芍薬甘草湯 Shakyakukanzoto 販売名: 漢方・芍薬甘草湯エキス錠N「コタロー」 60錠

使用上の注意

※**してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の診断を受けた人は服用しないこと: 心臓病
2. 症状があるときの服用にとどめ、連用しないこと

※**相談すること** 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 (3) 高齢者。(4) 次の症状のある人: むくみ (5) 次の診断を受けた人: 高血圧、腎臓病
 2. 服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師の診察を受けること

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミカバチ	手足のたるさ、しびれ、つぼり感やこぼりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
うっ血性心不全、心室頻拍	全身のたるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のたるさ、食欲不振等があらわれる。

3, 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果 体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症: こむらがえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

用法・用量

次の量を1日3回、食前又は食間に服用すること。 ※食間とは食後2~3時間を指す。

	1回	3錠	用法・用量に関する注意
大人(15歳以上)	1回	3錠	(1) 定められた用法・用量を厳守すること。
15歳未満 7歳以上	1回	2錠	(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
7歳未満 5歳以上	1回	1錠	
5歳未満	服用しないこと		

成分・分量 本剤9錠中

芍薬甘草湯エキス散(シャクヤク5.0g、カンゾウ5.0gより抽出) 3000mg

添加物として二酸化ケイ素、クロスカルメロースNa、無水ケイ酸、ステアリン酸Mgを含有。 ※本剤は生薬を原料としているので商品により多少色が異なることがあるが、品質・効果に変わりはない。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをしっかりして保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある)
- (4) ぬれた手や湿気を帯びた手で取り扱わないこと。(水分は錠剤の色や形が変わる原因になる)
- (5) 使用期限を過ぎた商品は服用しないこと。なお、使用期限内であっても、袋開封後はなるべく早く服用すること。
- (6) 袋の中に入っている乾燥剤は服用しないこと。

【お問い合わせ先】
 小太郎漢方製薬(株)お客様相談室
 TEL: 06(6371)9106
 受付時間 9:00~17:30
 (土、日、祝日を除く)

製造番号

使用期限

製造販売元
小太郎漢方製薬株式会社
 大阪市北区中津2丁目5番23号

MADE IN JAPAN

副作用報告徴収制度
06 0120 (149) 931



B0491

SH-1