

服用前にこの袋の説明文書を必ずお読みください。

切り口

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりと閉めください。

【販売名】 阪本漢法の芍薬甘草湯錠

漢方製剤 第2類医薬品

▲ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の診断を受けた人は服用しないこと。心臓病 2. 症状があるときのみ服用にとどめ、連用しないこと。

🗨️ **相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 高齢者 (4) 次の症状がある人: むくみ (5) 次の診断を受けた人: 高血圧、腎臓病
2. 服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれ、持続したりする。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
うつ血性心不全、 心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【効能・効果】 体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるもの次の諸症: こむらがり、筋力のけいれん、腹痛、腰痛

【用法・用量】 次の量を1日2～3回、水又はお湯で服用してください。

年 齢	1回量
成人(15才以上)	4錠
7才以上 15才未満	2錠
7才未満	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(2) 用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】 12錠中 芍薬甘草湯エキス 2.4g(シャクヤク 6g、カンゾウ 6gより抽出)、添加物: クロスCMC-Na、パレイショデンプン、メタケイ酸アルミン酸Mg、乳糖水和物、タルク、ステアリン酸Mg、カルナウバロウ
※本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、錠剤の色調等が多少異なることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
(4) めれた手で取り扱わないこと。(湿気は錠剤の色や形が変わる原因になる。)(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。(6) 開封後はなるべく早く使用すること。



【お客様相談室】 ☎06-6423-0565
(祝日を除く月～金曜日10:00～17:00)

製造番号

【製造販売元】  株式会社 阪本漢法製薬
兵庫県尼崎市名神町1-5-12

使用期限

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931