

✂ ここからお切りください。-----
開封後はチャックを閉めて保存してください。

漢方製剤



よろず芍薬甘草湯

しゃくやくかんぞうとう

第2類医薬品
90錠(5日分)

効能・効果

体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるもの次の諸症：こむらがり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

用法・用量

次の量を1日3回 食前又は食間に水又は白湯で服用して下さい

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	6錠	3回
15歳未満7歳以上	4錠	
7歳未満5歳以上	3錠	
5歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>
小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

1日量18錠(3.6g)中(カンゾウ3.0g・シャクヤク3.0g)芍薬甘草湯エキス(1/2量)0.9g
添加物としてカルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物を含有します。

✂ ここからお切りください。-----
開封後はチャックを閉めて保存してください。
服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



第2類医薬品

しゃくやくかんぞうとう

内容量 90錠
(5日分)

販売名：よろず芍薬甘草湯

使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
次の診断を受けた人。
心臓病
2. 症状があるときのみの服用にとどめ、
連用しないこと

⊗ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 次の症状のある人。
むくみ
(5) 次の診断を受けた人。
高血圧、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
角アトステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
うっ血性心不全、心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをして保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

【お問い合わせ】

花さらさ【薬店名】よろず漢方堂
福岡県福岡市早良区干隈3-16-1

☎0120-202-866
(午前9時～午後5時 土・日・祝日を除く)

【発売元】

株式会社フォーリーフ製薬
福岡県福岡市早良区干隈3-16-1

【製造販売元】

大和合同製薬株式会社
奈良県橿原市川西町632-1

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造番号

使用期限

