

ふくらはぎ
足裏・足指



急激な痛みに
飲んで効く!

井藤漢方製薬

足・指のつり

こむらがえり [満量処方]

しゃく やく かん そう とう
芍薬甘草湯



就寝中の
足のつり



運動中の
足のつり



冷えによる
足のつり

ツリラック

(販売名) ツリラック



第2類医薬品



1回4錠

粒はイメージです

【効能】 体力にかかわらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症：こむらがえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

※満量処方とは…

漢方処方より得られたエキスを全量配合していることを意味します。

MADE IN JAPAN

✂ <キリトリ>

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりと閉めること。 **漢方製剤**

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 心臓病の診断を受けた人は服用しないこと。 2. 症状があるときのみ服用にとどめ、連用しないこと。

👉 **相談すること** 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)高齢者(4)次の症状のある人:むくみ(5)次の診断を受けた人: 高血圧、腎臓病

2. 服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる
うっ血性心不全、心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる

3. 5~6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

用法・用量 次の量を食前又は食間に水又は白湯で服用すること。

年 齢	1回量	服用回数
大人(15才~)	4錠	1日3回
15才未満	× (服用しないこと)	

※食間とは…食後2~3時間のことです。

〈用法・用量に関連する注意〉

●用法・用量を厳守すること。

成分 1日量(12錠)中 芍薬甘草湯エキス2400mg (シャクヤク6g、カンゾウ6gより抽出)

添加物として、セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、無水ケイ酸、ヒプロメロースを含有する。

保管及び取り扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)ぬれた手で触れないこと。(湿気により変色する場合がある。)(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

井藤漢方製薬株式会社

〒577-0012 大阪府東大阪市長田東2-4-1

お客様相談室

☎ 06-6743-3033 10:00~17:00(土日祝を除く)

101010002 5820048-3-UT235