

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要ときに読めるよう大切に保管してください。

こむらがえり、足のつり、筋肉のけいれんに
しゃくやくかんぞうとう

DHC 漢方 芍薬甘草湯エキス錠

<一般用漢方製剤>

第2類医薬品

DHC漢方芍薬甘草湯エキス錠は、中国の古典医学書「傷寒論」^{しょうかんろん}に記載されている芍薬甘草湯のエキスを服用しやすい錠剤にした漢方薬です。筋肉のけいれんを鎮め、つらいこむらがえりや足のつり、腰痛などに効果があります。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。

次の診断を受けた人

心臓病

2. 症状があるときのみ服用にとどめ、連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 次の症状のある人。

むくみ

(5) 次の診断を受けた人。

高血圧、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
うっ血性心不全、 心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

裏面も必ずお読みください。

■ 効能・効果

体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症：
こむらがり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

■ 用法・用量

次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15才以上)	6錠	1日3回
7才以上15才未満	4錠	
5才以上7才未満	3錠	
5才未満	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■ 成分・分量

18錠(成人1日量)中

下記の成分及び分量からなる芍薬甘草湯エキス(1/2量)900mgを含有します。

成分	分量
カンゾウ	3.0g
シャクヤク	3.0g

添加物として、カルメロースCa、無水ケイ酸、結晶セルロース、ステアリン酸Mg、トウモロコシデンプン、乳糖を含有します。

【成分に関連する注意】

本剤は生薬を用いていますので、錠剤の色調が異なることがあります。

■ 保管及び取扱い上の注意

- 1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 4.使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- 5.ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防止するために入れてありますので、開封後は取り除いてください。
- 6.本剤にぬれた手で触れないでください。また、手にとった錠剤を元の容器にもどしますと、他の錠剤に影響を与えることがありますので注意してください。

医薬品
相談室

tel.044-233-2029

受付時間 9:00~17:00(日・祝日をのぞく)

DHC

製造販売元
株式会社ディー・エイチ・シー
東京都港区南麻布2-7-1

0120-333-906 www.dhc.co.jp