

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

漢方製剤

第2類医薬品

太虎堂の 仙 敢[®] <分包>

セ ン カ ン

仙敢^{せん かん} <分包> は「傷寒論^{しょう かん ろん}」という中国の書物に記載されている「芍薬^{しゃくやく}甘草湯^{かん ざう とう}」をエキス化し、服用しやすい散剤にしたものです。

腹部や手足の筋肉などに急激に起こるけいれんを緩解し痛みを鎮める作用があり、こむらがえり、腹痛等に効果があります。



◆ 使用上の注意 ◆

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 生後3カ月未満の乳児。
- (2) 次の診断を受けた人。
心臓病

2. 症状があるときのみの服用にとどめ、連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 次の症状のある人。
むくみ
- (5) 次の診断を受けた人。
高血圧、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
うつ血性心不全、 心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

◆ 効能・効果

体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症：
こむらがえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

◆ 用法・用量

1日3回食前または食間に温湯にて服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人（15才以上）	1包（1.0g）	3回
15才未満7才以上	2 / 3包	
7才未満4才以上	1 / 2包	
4才未満2才以上	1 / 3包	
2才未満	1 / 4包以下	

<用法・用量に関する注意>

- （1）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- （2）1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

◆ 成分・分量

1日分3包（1包 1.0g）中、以下より抽出した芍薬甘草湯エキス1,000mgを含有しています。

日局シャクヤク……………	6.0g
日局カンゾウ……………	6.0g

添加物として日局乳糖水和物を含有しています。

◆ 保管及び取扱い上の注意

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- （2）小児の手の届かない所に保管してください。
- （3）他の容器に入れ替えないでください。
（誤飲の原因になったり品質が変わることがあります。）
- （4）1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- （5）本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがありますが、品質・効果に変わりはありません。

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までお願いいたします。
太虎精堂製薬株式会社 TEL078-232-1015
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）