

2013年 8月改訂(記載要領変更に伴う改訂)

2009年 3月作成

服用に際し、この説明書を必ず読むこと。また、必要なとき読めるように大切に保管すること。

十全大補湯(漢方薬)

補全-S

第2類医薬品

本品は漢方処方「十全大補湯」を服用しやすくしたシロップ剤です。「十全大補湯」は慢性諸病による体力低下をはじめとして、疲労倦怠、貧血、手足の冷えなどにすぐれた効果を発揮いたします。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - 1) 医師の治療を受けている人。
 - 2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 3) 胃腸の弱い人。
 - 4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

下痢

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効能効果

体力虚弱なもの次の諸症:

病後・術後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血。

用法用量

成人(15才以上) 1回 5mLを1日2回服用する。よく振ってから服用すること。15才未満は服用しないこと。

(計量には添付の目盛り付きコップを使用ください。数字の単位はmLです。)

裏面に続く

成分分量

1日量 (10mL) 中

十全大補湯エキス1,000mg配合

本エキス1,000mgは下記の生薬より抽出したものです。

ニンジン	1.5g	オウギ	1.5g
ソウジュツ	1.5g	ブクリョウ	1.5g
トウキ	1.5g	シャクヤク	1.5g
ジオウ	1.5g	センキュウ	1.5g
ケイヒ	1.5g	カンゾウ	0.5g

添加物としてハチミツ、白糖、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、フマル酸Na、エタノール、安息香酸Na、パラベン、パニリン、エチルパニリン、香料を含有する。

保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
2. 小児の手のとどかない所に保管すること。
3. 他の容器に入れかえないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
4. 開栓後はフタをしっかりとしめ、冷蔵庫に立てて保管すること。
5. 雑菌などの汚染の恐れがあるので、ピンの口に直接口をつけて服用したり、目盛り付きコップに入れたものをピンに戻さないこと。
6. 品質保持の点から、開栓後早めに服用すること。
7. 開栓後、味・においなどに変化があり異常を感じた場合には、直ちに服用を中止すること。
8. 生薬成分を配合した内服液です。まれに沈殿を生じることがあるため、よく振ってから服用すること。
9. ピンの口、目盛り付きコップは清潔に保つこと。
10. 表示の使用期限を過ぎたものは服用しないこと。

[問い合わせ先]

1. 購入した薬局・薬店

2. 日水製薬株式会社

お客様相談窓口 電話:03-3837-0987

受付時間:午前10時~12時 午後1時~5時

(土・日・祝日を除く)

発売元  **日水製薬株式会社**

東京都台東区上野3-23-9

製造販売元  **明治薬品株式会社**

富山県富山市三郷6番地

副作用被害救済制度の問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

0120-149-931