

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

T-133B

第2類医薬品

じゅう ぜん たい ほ とう

十全大補湯エキス顆粒KM

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。
- (3)胃腸の弱い人。
- (4)高齢者。
- (5)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (6)次の症状のある人。
むくみ
- (7)次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

[効能又は効果]

体力虚弱などの次の諸症：病後・術後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血

[用法及び用量]

食前又は食間に服用する。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	3.0 g	3回
小児 15歳未満 7歳以上	2.0 g（約2/3匙）	
7歳未満 4歳以上	1.5 g（約1/2匙）	
4歳未満 2歳以上	1.0 g（約1/3匙）	
2歳未満	0.75 g（約1/4匙）以下	

〔用法及び用量に関連する注意〕

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
(2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させること。

〔成分及び分量〕 1日量(9.0 g)中

十全大補湯水製乾燥エキス(出典：漢方診療医典) 5.00 g

日本薬局方	ジオウ	3.5 g
日本薬局方	ソウジュウ	3.5 g
日本薬局方	トウキ	3.5 g
日本薬局方	ブクリヨウ	3.5 g
日本薬局方	ケイヒ	3.0 g
日本薬局方	シャクヤク	3.0 g
日本薬局方	センキュウ	3.0 g
日本薬局方	オウギ	2.5 g
日本薬局方	ニンジン	2.5 g
日本薬局方	カンゾウ	1.0 g

添加物として、乳糖、ステアリン酸マグネシウムを含有する。

○本剤は天然の生薬から有効成分を抽出した製剤ですので、製品により顆粒剤の色・風味が若干異なることがあります、薬効には変わりありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
(2)小児の手の届かない所に保管すること。
(3)他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わること。）

〔お問い合わせ先〕

一元製薬株式会社「お客様相談室」

〒171-0043 東京都豊島区要町3-4-10

電話：03-3973-2917

○受付時間：9:00～17:00（土、日、祝祭日を除く）

発売元 **一元製薬株式会社**
東京都豊島区要町3-4-10

製造販売元
(輸入元) **北日本製薬株式会社**
富山県中新川郡上市町若杉55