

第2類医薬品

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
又、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

漢方薬

じゅうみ はいどくとう  
**十味敗毒湯エキス錠〔大峰〕**

**⚠ 使用上の注意**



**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
  - (4) 胃腸の弱い人。
  - (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 1ヵ月位（化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
3. 本剤の服用により、まれに症状が進行することもあるので、このような場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**《効能又は効果》**

体力中等度なもの皮膚疾患で、発赤があり、ときに化膿するものの次の諸症：化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期、じんましん、湿疹・皮膚炎、水虫

**《用法及び用量》**

次の量を1日3回食前又は食間に、水又は白湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	4錠	3回
15歳未満7歳以上	3錠	
7歳未満5歳以上	2錠	
5歳未満	服用しないこと	

**《用法・用量に関連する注意》**

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

（裏面もお読みください）

## 《成分及び分量》

十味敗毒湯エキス錠〔大峰〕の1日量(12錠)中には下記生薬より得た十味敗毒湯エキス2000mgを含む。

サイコ	1.5 g	カンゾウ	0.5 g
キキョウ	1.5 g	ケイガイ	0.5 g
センキュウ	1.5 g	ショウキョウ	0.16 g
ブクリヨウ	1.5 g	オウヒ	1.5 g
レンギョウ	1.5 g	ドクカツ	1.0 g
ボウフウ	1.0 g		

添加物として、ステアリン酸Mg、CMC-Ca、セルロース、メタケイ酸アルミニン酸Mg、水酸化Al/Mg、乳糖を含有する。

## 《保管及び取扱い上の注意》

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(ビン包装の場合は、密栓して保管してください。)
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは下記にお願い申し上げます。

大峰堂薬品工業株式会社 「消費者相談窓口」

〒635-0051 奈良県大和高田市根成柿574

電話 (0745) 22-3601(代)

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 大峰堂薬品工業株式会社

奈良県大和高田市根成柿574