

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また必要なときに読めるように大切に保管しておいてください。

第2類医薬品

ジュウミハイ ドク 錠

(十味敗毒錠)

漢方の皮膚病内服薬

湿疹、蕁麻疹、頭瘡などの軽症の皮膚病、初発時のものは、普通は外用薬だけでも治ることがありますが、その人の体質によっては治癒が長引くこともあります。また皮膚病の原因が肝臓、腎臓、胃腸、糖尿病、婦人科疾患であるもの、また逆に、皮膚病から腎臓や肝臓に障害を引き起こしたのものなどは内服薬を必要とするものがあります。

皮膚病は、皮膚表面に症状の現れる病気ではありますが、漢方医学では血液循環障害や内臓機能障害を重視して、本剤のような内服薬を主用とし、外用薬（紫雲膏など）を補助的に使用することがあります。

製品の特徴

本剤は、茶褐色の素錠で、特有のにおいと味があります。



使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - (4) 胃腸の弱い人。
 - (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみなどを起こしたことがある人。
2. 1ヶ月くらい（化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期に服用する場合には1週間くらい）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
3. 本剤の服用により、まれに症状が進行することもありますので、このような場合には、服用を中止し、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

効能・効果

湿疹・皮膚炎、癬、腫癰、頭瘡、蕁麻疹

注)「癬（セツ）」とは、おできのことです。

「腫癰（シュヨウ）」とは、癬の集まったもののことです。

「頭瘡（ズソウ）」とは、頭部のふきでもの（にきび）のことです。

用法・用量

大人は1回に8錠ずつ、1日3回食前または食間に、水または白湯にて服用してください。
小児用量は、

15歳以下8歳まで 1回4錠 4歳以下2歳まで 1回2錠
7歳以下5歳まで 1回3錠

また服用に際して、次のことに注意してください。

- 定められた用法、用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

成分・分量

本剤は大人1日の服用量24錠中に次の成分を含んでいます。

日局サイコ	0.5 g	日局ハマボウフウ	0.35 g
日局オウヒ	0.35g	日局センキュウ	0.35 g
日局キキョウ	0.35g	日局ケイガイ	0.15 g
日局ショウキョウ	0.15g	日局カンゾウ	0.15 g
日局ブクリョウ	0.45g	日局レンギョウ	0.20 g
日局ドクカツ	0.35g		

日局サイコ 1.2g、日局オウヒ 1.2g、日局キキョウ 1.2g、日局ショウキョウ 0.4g、日局ブクリョウ 1.5g、日局ドクカツ 1.2g、日局ハマボウフウ 1.2g、日局センキュウ 1.2g、日局ケイガイ 0.5g、日局カンゾウ 0.5g、日局レンギョウ 1.0gの水溶性乾燥エキス……1.45 g

保管および取り扱い上の注意

- (1) お子さまの手のとどかない所に保管してください。
- (2) 品質を保つため、直射日光をさけ、涼しい所に保管してください。
- (3) 誤った使い方をさけ、品質を保つために、他の容器に入れかえないでください。

その他

- 本剤は生薬（薬用の草根木皮など）を原料とした薬ですので、製品により、錠剤の色調などが多少異なることがあります。効能・効果にかわりありません。
- 長い間保存していて、再び服用される場合は、薬が湿っていないか、不快なおいがないか、虫害がないかなどをよく確かめてから、服用してください。

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

長倉製薬株式会社 ☎06-6652-5000

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）



長倉の漢方薬

製造販売元

長倉製薬株式会社

大阪市西成区聖天下 1-7-16