

第2類医薬品



漢方煎専科

# 十味敗毒湯

6

5日分10包



自然のちから、ひとに活かして  
株式会社 タキザワ漢方廠

# 漢方薬 十味敗毒湯「タキザワ」

17K

## △＜使用上の注意＞

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の人は服用しないでください。  
生後3ヵ月未満の乳児



### ■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人)
- (4) 胃腸の弱い人
- (5) 高齢者
- (6) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (7) 次の症状のある人  
むくみ
- (8) 次の診断を受けた人  
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位 (化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期に服用する場合には1週間位) 服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

5. 本剤の服用により、まれに症状が進行することもありますので、このような場合には、服用を中止し、この袋を持って(\*)医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 【成分・分量】

サイコ	3.0g	ドクカツ	3.0g
オウヒ	3.0g	ポウフウ	3.0g
キキョウ	3.0g	カンゾウ	1.0g
センキュウ	3.0g	ショウキョウ	1.0g
ブクリョウ	4.0g	ケイガイ	1.0g
1日分 (1包12.5g×2) 25.0g			

## 【効能・効果】

体液中程度なものの皮膚疾患で、発赤があり、ときに化膿するものの次の諸症：化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期、じんましん、湿疹・皮膚炎、水虫

## 【用法・用量】

1日2回朝夕の空腹時に、本品1包(1回分)を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて半量ぐらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、次の量を服用してください。

年 齢	1回量
大人 (15歳以上)	全量
15歳未満 7歳以上	大人の2/3
7歳未満 4歳以上	大人の1/2
4歳未満 2歳以上	大人の1/3
2歳未満	大人の1/4

## ＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



製造販売元

株式会社 **タキザワ漢方**

さいたま市大宮区堀の内町2丁目623-1  
お客様相談室 ☎048-688-7923  
受付時間：9時～18時(月～金)

タキザワ漢方



ホームページ:takizawa.asia

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

☎ 0120-149-931



4 974961 180469

