



服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に、読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

# 漢方製剤 ケンショトウ

(小建中湯エキス製剤)

## 特 徴

ケンショトウは、小建中湯（しょうけんちゅうとう）という漢方薬のエキスを飲みやすい顆粒剤にしたものです。本剤は、血色が悪く、疲れやすい体力虚弱な人の滋養強壯剤ともいえるお薬で、とくに子供さんと、ときどき腹痛を訴えたり、ちょっとした運動で疲れやすく、神経質で、夜泣きやお寝しょをするという人に、すぐれた効きめがあります。



### 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 吐き気・嘔吐のある人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。
    - むくみ
  - 次の診断を受けた人。
    - 高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 効能又は効果

体力虚弱で、疲労しやすく腹痛があり、血色がすぐれず、ときに動悸、手足のほてり、冷え、ねあせ、鼻血、頻尿および多尿などを伴うものの次の諸症：

小児虚弱体質、疲労倦怠、慢性胃腸炎、腹痛、神経質、小児夜尿症、夜泣き

### 用法及び用量

次の量を食前または食間に、水またはお湯で服用してください。  
(食間とは食後2～3時間を指します)

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	1包	3 回
15歳未満7歳以上	$\frac{2}{3}$ 包	
7歳未満4歳以上	$\frac{1}{2}$ 包	
4歳未満2歳以上	$\frac{1}{3}$ 包	
2歳未満	$\frac{1}{4}$ 包	

### <用法及び用量に関連する注意>

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合のみ服用させてください。

### 成分及び分量

本剤3包（1包4.2g）中に、

ケイヒ（桂皮）	2g	カンゾウ（甘草）	1g
ショウキョウ（生姜）	0.5g	シャクヤク（芍薬）	3g
タイソウ（大棗）	2g		

上記生薬より抽出された桂枝加芍薬湯エキス2.0g及びコウイ（膠飴）10gが含まれています。

添加物として、トウモロコシデンブ、ショ糖脂肪酸エステルを含有しています。

### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

●本剤は天然の生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異が生じることがあります。効果には変わりありません。

### 本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 医薬情報部  
〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1-8-6  
TEL (06) 6629-9058  
受付時間 10時から17時まで（土、日、祝日を除く）

大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2