

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また必要なときに読めるように大切に保管しておいてください。

第2類医薬品

小柴胡 粒状

(しょうさいこ)

製品の特徴

本剤は、褐色の顆粒で、わずかににおいがあり、甘味と苦味があります。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の人は服用しないでください。

生後3ヶ月未満の乳児。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみなどを起こしたことがある人。
- (5) 次の診断を受けた人。肝臓病
- (6) インターフェロン製剤で治療を受けている人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症状 |
|------|---------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| その他 | 頻尿、排尿痛、血尿、残尿感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症状 |
|-------|---|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱などがみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振などがあらわれる。 |

3. 1ヶ月くらい(かぜの後期の諸症状に服用する場合には1週間くらい)服用して

も症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

効能・効果

感冒、気管支炎、耳下腺炎、肋膜炎

用法・用量

大人は1回に1.5gまたは1包(1.5g)ずつ、1日3回食前または食間に、水または白湯にて服用してください。

小児用量は大人用量を1とするとき、

| | | | |
|-----------|------|----------|-------|
| 15歳以下8歳まで | 1/2量 | 4歳以下2歳まで | 1/6量 |
| 7歳以下5歳まで | 1/3量 | 1歳以下 | 1/12量 |

また服用に際して、次のことに注意してください。

- 定められた用法、用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

成分・分量

本剤は大人1日の服用量4.5gまたは3包(4.5g)中に次の成分を含んでいます。

| | | | |
|------------|------|----------|------|
| 日局サイコ | 1.5g | 日局カンゾウ | 0.3g |
| 日局オウゴン | 0.6g | 日局ショウキョウ | 0.3g |
| 日局ハンゲ | 0.6g | 日局タイソウ | 0.6g |
| 日局チクセツニンジン | 0.6g | | |

保管および取り扱い上の注意

- (1)お子さまの手のとどかない所に保管してください。
- (2)品質を保つため、直射日光をさけ、涼しい所に保管してください。
- (3)誤った使い方をさけ、品質を保つために、他の容器に入れかえないでください。

その他

- 本剤は生薬(薬用の草根木皮など)を原料とした薬ですので、製品により、顆粒の色調などが多少異なることがあります。効能・効果にかわりありません。
- 長い間保存していて、再び服用される場合は、薬が湿っていないか、不快なおいがないか、虫害がないかなどをよく確かめてから、服用してください。

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

長倉製薬株式会社 ☎06-6652-5000

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



長倉製薬株式会社

大阪市西成区聖天下 1-7-16

長倉の漢方薬