

第2類医薬品



漢方煎専科

# 小柴胡湯

9

5日分10包



自然のちから、ひとに活かして  
株式会社 **タキザワ漢方** 廠



# 漢方薬 小柴胡湯 「タキザワ」

17F

## △＜使用上の注意＞

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児



### ■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
- (4) 高齢者
- (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (6) 次の症状のある人  
むくみ
- (7) 次の診断を受けた人  
肝臓病、高血圧、心臓病、腎臓病
- (8) インターフェロン製剤で治療を受けている人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性ありますので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状           |
|------|---------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ     |
| その他  | 頻尿、排尿痛、血尿、残尿感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称           | 症 状  |
|-----------------|--|
| 間質性肺炎           | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。                    |
| 肝機能障害           | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。                  |

3. 1ヵ月位(かぜの後期の諸症状に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 【成分・分量】

|      |      |        |      |
|------|------|--------|------|
| サイコ  | 8.0g | ニンジン   | 3.0g |
| ハシゲ  | 8.0g | カンゾウ   | 3.0g |
| オウゴン | 3.0g | ショウキョウ | 1.0g |
| タイソウ | 3.0g |        |      |

1日分(1包14.5g×2) 29.0g

### 【効能・効果】

体力中等度で、ときに脇腹(腹)からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振や口の苦みがあり、舌に白苔がつくもの次の諸症：食欲不振、はきけ、胃炎、胃痛、胃腸虚弱、疲労感、かぜの後期の諸症状

### 【用法・用量】

◎大人及び15歳未満7歳以上の場合

1日2回朝夕の空腹時に、本品2包(1日分)を和紙袋入りのまま、水約600mLを加えて半量ぐらゐまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、次の量を服用してください。

| 年 齢       | 1回量    |
|-----------|--------|
| 大人(15歳以上) | 煎液の1/2 |
| 15歳未満7歳以上 | 煎液の1/3 |

又は1日2回朝夕の空腹時に、本品1包(1回分)を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて上記と同様に製し、次の量を服用してください。

| 年 齢       | 1回量    |
|-----------|--------|
| 大人(15歳以上) | 煎液全部   |
| 15歳未満7歳以上 | 煎液の2/3 |

◎7歳未満の場合

1日2回朝夕の空腹時に、本品1包を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて上記と同様に製して、次の量を服用してください。

| 年 齢      | 1回量      |
|----------|----------|
| 7歳未満4歳以上 | 煎液の1/2   |
| 4歳未満2歳以上 | 煎液の1/3   |
| 2歳未満     | 煎液の1/4以下 |

### ＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



4 974961 180476



製造販売元  
株式会社 **タキザワ漢方**  
さいたま市大宮区堀の内町2丁目623-1  
お客様相談室 ☎048-688-7923  
受付時間：9時～18時(月～金)

タキザワ漢方



ホームページ:takizawa.asia

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

☎0120-149-931