

## 第2類医薬品

この添付文書は必要な時に読めるように大切に保管し、服用の際には必ずお読みください。



## 漢方製剤 JPS 漢方顆粒-25号 (小青竜湯)

小青竜湯は比較的体力がなく、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出る方の花粉症、鼻炎、気管支ぜんそく、かぜなどを改善します。水分の代謝を調整し、アレルギーを抑える働きがあります。

本剤は漢方処方である小青竜湯の生薬を抽出し、乾燥エキスとした後、服用しやすい顆粒剤としました。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

生後3ヵ月未満の乳児。



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状            |
|------|----------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ      |
| 消化器  | 吐き気、食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称           | 症 状  |
|-----------------|--|
| 間質性肺炎           | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。                    |
| 肝機能障害           | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。                  |

3. 1ヵ月位(感冒に服用する場合には5～6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 〔効能・効果〕

体力中等度又はやや虚弱で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出るものの次の諸症：  
気管支炎、気管支ぜんそく、鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒、花粉症

## 〔用法・用量〕

次の量を食前又は食間に水又はお湯にて服用してください。

| 年 齢       | 1 回 量 | 1 日 服 用 回 数 |
|-----------|-------|-------------|
| 成人（15才以上） | 1 包   | 3 回         |
| 7才以上15才未満 | 2/3包  |             |
| 4才以上7才未満  | 1/2包  |             |
| 2才以上4才未満  | 1/3包  |             |
| 2才未満      | 1/4包  |             |

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
- (3)食間とは食後2～3時間を指します。

## 〔成分・分量〕

3包(7.5g)中

小青竜湯エキス(4/5量)4.0gを含有しています。

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 日局マ オ ウ …… 2.4 g | 日局シャクヤク …… 2.4 g |
| 日局カンキョウ …… 2.4 g | 日局カンゾウ …… 2.4 g  |
| 日局ケ イ ヒ …… 2.4 g | 日局サイシン …… 2.4 g  |
| 日局ゴ ミ シ …… 2.4 g | 日局ハンゲ …… 4.8 g   |

上記生薬量に相当します

添加物として、ステアリン酸Mg、乳糖水和物を含有しています。

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は吸湿しやすいので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返してテープ等で封をし、なるべく1日以内に服用してください。(開封状態で置いておくと顆粒が変色することがあります。変色した場合は、服用しないでください。)
- (5)本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を原料として使用していますので、製品により色調等が異なることがありますが、効能・効果には変わりありません。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店  
あるいは下記にお願いいたします。  
ジェービーエス製薬 お客様相談室  
電 話 045-593-2136  
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



ジェービーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1  
発 売 元 横浜市都筑区東山田4-42-22