

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください
また、必要時に読めるよう大切に保管しておいてください

第2類医薬品

小青竜湯

小青竜湯エキス顆粒「トーア」



使用上の注意

相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - 胃腸の弱い人。
 - 発汗傾向の著しい人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間 質 性 肺 炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝 機 能 障 害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位（感冒に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔小青竜湯エキス顆粒「トーア」はこんなときに〕



アレルギー性鼻炎・花粉症



気管支炎



気管支ぜんそく

〔成分・分量〕

1日量3包（1包3.0g）中

小青竜湯エキス……3.0g

マオウ……1.5g	ケイヒ……1.5g
シャクヤク……1.5g	サイシン……1.5g
ショウキョウ……1.5g	ゴミシ……1.5g
カンゾウ……1.5g	ハンゲ……3.0g

より製した乾燥エキス

添加物：白糖，乳糖，D-マンニトール，シヨ糖脂肪酸エステルを含有。

〔効能・効果〕

体力中等度又はやや虚弱で，うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出るものの次の諸症：気管支炎，気管支ぜんそく，鼻炎，アレルギー性鼻炎，むくみ，感冒，花粉症

〔用法・用量〕

下記の量を食前または食間にそのまま水かお湯で服用する。またはお湯を加えてかき混ぜて溶かし，熱いうちに服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	1包	3回
7才以上15才未満	2/3包	
4才以上7才未満	1/2包	
4才未満	服用しないこと	


食間とは食事と食事の間で，前の食事から2～3時間後

〔用法・用量に関連する注意〕

1. 4才以上の幼小児に服用させる場合には，保護者の指導監督のもとに服用させること。
2. 溶かして服用した後，溶け残りがある場合にはお湯を加えて溶かし，残らず服用すること。

〔保管及び取扱い上の注意〕

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。
（誤用の原因になったり品質が変わる。）
4. 1包を分割して服用した残りは，袋の口を2回折り返して保管し，2日以内に服用すること。



製品についてのお問い合わせは，お買い求めのお店または下記までお願いします。

北日本製薬株式会社 〒930-0314 富山県中新川郡上市町若杉55
電話番号076-472-1011 受付時間9：00～16：30（土、日、祝日を除く）