

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また必要なときに読めるように大切に保管しておいてください。

第2類医薬品

ショウセイリュウ錠

(小青龍錠)

製品の特徴

本剤は、茶褐色の素錠で、特有のにおいと味があります。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - 胃腸の弱い人。
 - 発汗傾向の著しい人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみなどを起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はきけ、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱などがみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振などがあらわれる。

- 1ヶ月くらい（感冒に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなら

ない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

効能・効果

胃部に水分停滞感があり、発熱、せき、水泡性のたん、鼻汁、尿量減少などを伴うもの。
気管支カタル、気管支ぜんそく、感冒性せき、ネフローゼ

注)「気管支カタル」とは、気管支炎のことです。

用法・用量

大人は1回に8錠ずつ、1日3回食前または食間に、水または白湯にて服用してください。
小児用量は、

15歳以下8歳まで 1回4錠 4歳以下2歳まで 1回2錠
7歳以下5歳まで 1回3錠

また服用に際して、次のことに注意してください。

- 定められた用法、用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

成分・分量

本剤は大人1日の服用量24錠中に次の成分を含んでいます。

日局マ オ ウ	0.6g	日局ケ イ ヒ	0.3g
日局シャクヤク	0.6g	日局サイシン	0.6g
日局ショウキョウ	0.2g	日局ゴミシ	0.5g
日局カンゾウ	0.3g	日局ハンゲ	0.6g

日局マオウ 1g、日局シャクヤク 1g、日局ショウキョウ 0.5g、日局カンゾウ 1g、日局ケイヒ 1g、日局サイシン 1g、日局ゴミシ 1g、日局ハンゲ 2gの水製乾燥エキス.....1.1g

保管および取り扱い上の注意

- (1) お子さまの手のとどかない所に保管してください。
- (2) 品質を保つため、直射日光をさけ、涼しい所に保管してください。
- (3) 誤った用い方をさけ、品質を保つために、他の容器に入れかえないでください。

その他

- 本剤は生薬（薬用の草根木皮など）を原料とした薬ですので、製品により、錠剤の色調などが多少異なることがあります。効能・効果にかわりありません。
- 長い間保存していて、再び服用される場合は、薬が湿っていないか、不快なおいがないか、虫害がないかなどをよく確かめてから、服用してください。

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

長倉製薬株式会社 ☎06-6652-5000

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元



長倉製薬株式会社

大阪市西成区聖天下 1-7-16

長倉の漢方薬