

新様式  
2002. 11  
薬事法改正に伴う改訂  
2005年5月

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。  
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

# 東洋漢方の小半夏加茯苓湯

(しょうはんげかぶくりょうとう)

第2類医薬品

本剤は、漢方の古典「金匱要略」に記載されている小半夏加茯苓湯に準拠して製造された煎薬用の紙パック剤です。



相談すること



— 使用上の注意 —

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6日間服用しても症状の改善がみられない場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。

## [効能・効果]

つわり、嘔吐・悪心

## [用法・用量]

1包(1日量)につき水400mLの水をもって煮て200mLに煮つめ、滓をこして取り去り、食前に温服して下さい。

年齢	1包(1日量) 煎じ液	1日 服用回数
大人(15才以上)	全量	3回に分けて

## <用法及び用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること。

## [成分・分量] [本品1包(1日量) 15.0g中]

日本薬局方 ハンゲ……………9.0g  
日本薬局方 ブクリョウ……………3.0g  
日本薬局方 ショウキョウ……………3.0g


## [保管及び取扱い上の注意]

- (1) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- (4) 煎じ薬は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用すること。

## [問い合わせ先]

東洋漢方製薬株式会社 フリーダイヤル 0120-00-1040  
受付時間10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

 東洋漢方製薬株式会社

大阪府富田林市中野町東2-1-16