

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

## 辛夷清肺湯エキス顆粒「クラシエ」

(シンイセイハイトゥ)

### 特 徴

- 「辛夷清肺湯」は、漢方の古典といわれる中国の医書「外科正宗」に収載されている薬方です。
- 濃い鼻汁が出て、ときに熱感を伴う人の鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症に効果があります。

### ⚠ 使用上の注意



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）  
(4) 胃腸虚弱で冷え症の人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位  | 症 状        |
|-------|------------|
| 消 化 器 | 食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称    | 症 状                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 間質性肺炎    | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 肝機能障害    | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。                  |
| 腸間膜静脈硬化症 | 長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。                                  |

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 効 能

体力中等度以上で、濃い鼻汁が出て、ときに熱感を伴うものの次の諸症：鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症（副鼻腔炎）

## 用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

| 年 齢       | 1回量     | 1日服用回数 |
|-----------|---------|--------|
| 成人（15才以上） | 1包      | 3回     |
| 15才未満7才以上 | 2／3包    |        |
| 7才未満4才以上  | 1／2包    |        |
| 4才未満2才以上  | 1／3包    |        |
| 2才未満      | 服用しないこと |        |

### 〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成 分

成人1日の服用量3包（1包1.5g）中、次の成分を含んでいます。

\* 辛夷清肺湯エキス（1／2量）……………2,500mg

〔チモ・オウゴン・シンイ・ビャクゴウ各1.5g、サンシシ・ショウマ各0.75g、バクモンドウ・セッコウ各3.0g、ビワヨウ0.5gより抽出。〕

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖を含有する。

### 〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物（生薬）のエキスをを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、2日を過ぎた場合には服用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<https://www.pmda.go.jp/>  
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ 薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334  
受付時間 10:00～17:00（土、日、祝日を除く）

ホームページ [www.kracie.co.jp](http://www.kracie.co.jp)

発 売 元 **クラシエ 薬品株式会社**  
東京都港区海岸3-20-20（〒108-8080）

製造販売元 **大峰堂薬品工業株式会社**  
奈良県大和高田市根成柿574（〒635-0051）

押して開ける

第2類医薬品

販売名：辛夷清肺湯エキス顆粒「クラシエ」

〈成分〉成人1日の服用量3包(1包1.5g)中  
辛夷清肺湯エキス(1/2量)…2,500mg  
(チモ・オウゴン・シンイ・ビャクゴウ各1.5g、サンシシ・ショウマ各0.75g、  
バクモンドウ・セッコウ各3.0g、ビワヨウ0.5gより抽出。  
添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖を含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。

〈効能〉体力中等度以上で、濃い鼻汁が出て、ときに熱感を伴うものの次の諸症：鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症(副鼻腔炎)

〈用法・用量〉1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

成人(15才以上)…1回 1包 15才未満7才以上…1回2/3包  
7才未満4才以上…1回1/2包 4才未満2才以上…1回1/3包  
2才未満は服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〈保管及び取扱い上の注意〉

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。  
(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。(5)1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、2日を過ぎた場合には服用しないでください。

発売元 クラシエ 薬品株式会社 副作用被害救済制度の問合せ先

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080) ☎0120-149-931

ホームページ www.kracie.co.jp

お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334

受付時間 10:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元 大峰堂薬品工業株式会社

奈良県大和高田市根成柿574(〒635-0051)

18295

△ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)  
(4)胃腸虚弱で冷え症の人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症状         |
|------|------------|
| 消化器  | 食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称    | 症状                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 間質性肺炎    | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 肝機能障害    | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。                  |
| 腸間膜静脈硬化症 | 長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。                                  |

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください