

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの 参蘇飲

ジンソイン

ウチダの参蘇飲は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎じ薬で、特異なおいがあります。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）
 次の人は服用しないこと
 生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
むくみ
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
 その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つ っぱり感やこわばりに加え て、脱力感、筋肉痛があら われ、徐々に強くなる。

- 1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果
 感冒、せき

用法・用量

年齢	1日量
大人（15歳以上）	1袋（1日分）につき水約600mLを加え、あまり強くない火にかけ約300mLに煮つめ、袋をとり出し3回に分けて食前1時間又は食間空腹時に温服する。
15歳未満7歳以上	大人の煎液の2/3量を3回に分けて食前1時間又は食間空腹時に温服する。
7歳未満4歳以上	大人の煎液の1/2量を3回に分けて食前1時間又は食間空腹時に温服する。
4歳未満2歳以上	大人の煎液の1/3量を3回に分けて食前1時間又は食間空腹時に温服する。
2歳未満	大人の煎液の1/4量以下を3回に分けて食前1時間又は食間空腹時に温服する。

用法・用量に関連する注意

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

成分・分量

本品1袋（1日分）中								
ソ	ヨ	ウ	1.0g	ニ	ン	ジ	ン	1.5g
キ	ジ	ツ	1.0g	タ	イ	ソ	ウ	1.5g
キ	キ	ョ	ウ	2.0g	シ	ョ	ウ	0.5g
チ	ン	ビ	2.0g	モ	ッ	コ	ウ	1.0g
カ	ッ	コ	ン	2.0g	カ	ン	ゾ	ウ
ハ	ン	ゲ	3.0g	ゼ	ン	コ	2.0g	
ブ	ク	リ	ョ	ウ	3.0g			
全 量								21.5g

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141
 受付時間 9:00~17:30（土、日、祝日を除く）

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬
 東京都荒川区東日暮里 4-4-10