

第2類医薬品

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

漢方製剤

中国の民間説話「白蛇伝」
に登場する女性を伝統的な
漢方のイメージとしてシン
ボルマークとしたものです。じん りょう びやく じゅつ さん りょう
参苓白朮散料

エキス細粒G「コタロー」

商品番号

D062

体が疲れやすく、食欲がない。食後胃のあたりがはってきたり、食べ過ぎたり油ものを食べると下痢をする。もう少し太りたいのに、太れない。このような症状は、胃腸虚弱で、消化や吸収がうまく行われていないために起こります。下痢をしたり、栄養を吸収できないと、せっかく食べた美味しいものも身に付かず、太れなかったり、体が疲れやすくなったりします。

参苓白朮散料エキス細粒G「コタロー」は、疲れやすく、やせて顔色も悪い方の胃腸の動きを調節して、下痢や食欲不振を改善する薬です。

**使用上の注意****してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

生後3カ月未満の乳児。

**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3)高齢者。
 - (4)次の症状のある人。
むくみ
 - (5)次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

【効能・効果】やせて顔色が悪く、食欲がなく下痢が続く傾向があるものの次の諸症：
食欲不振、慢性下痢、病後の体力低下、疲労倦怠

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。
食間とは……食後2～3時間を指します。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1包 または 2.0g	3回
15歳未満7歳以上	2/3包 または 1.3g	
7歳未満4歳以上	1/2包 または 1.0g	
4歳未満2歳以上	1/3包 または 0.7g	
2歳未満	1/4包 または 0.5g	

（大入り剤に添付のサジは、すり切り一杯で約0.6gです）

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量】


成分・分量 本剤3包（6.0g）中		
ニンジン ……	2.4g	ヨクイニン …… 4.0g
サンヤク ……	2.4g	ヘンズ …… 1.6g
ビャクジュツ ……	3.2g	レンニク …… 1.6g
ブクリョウ ……	3.2g	カンゾウ …… 1.2g

より抽出した水製エキス3.9gを含有しています。

添加物として含水二酸化ケイ素、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプンを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- (4)水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
（分包剤のみ）
- (6)湿気などにより薬が変質することがありますので、服用後は、ビンのフタをよくしめてください。
（大入り剤のみ）
- (7)使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。
- (8)ビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。
（大入り剤のみ）



本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることがあります。品質・効果に変わりはありません。

商品内容についてのお問い合わせは、お買求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106
受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

漢方薬ガイド
請求券



D062 A26

左のシールをハガキに貼って、お買求めの店名、住所、氏名、年齢、職業、電話番号、症状をお書きそえのうえ、お申込みください。漢方薬と食養を詳しく説明した、パンフレットをお送りいたします。

製造販売元 漢方をよりよく より多くの人に



小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号
TEL 06 (6371) 9106

第2類医薬品

漢方製剤

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

慢性下痢に

販売名 参苓白朮散料エキス細粒G「コタロー」

商品番号

Q062

疲れやすくて食欲がない、食べ過ぎたり油ものを食べると下痢をする、もう少し太りたいのに太れない。そのような時に応用されるのがこのお薬です。

胃腸機能を高め、慢性的に続く下痢に効果があります。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3)高齢者。
- (4)次の症状のある人。
むくみ
- (5)次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください**
- 4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください**

【効能・効果】

やせて顔色が悪く、食欲がなく下痢が続く傾向があるものの次の諸症：
慢性下痢、食欲不振、疲労倦怠、病後の体力低下

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。
食間とは……食後2～3時間を指します。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
大人（15歳以上）	1 包	3 回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	
4歳未満2歳以上	1/3包	
2歳未満	1/4包	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量】



成分・分量 本剤3包（6.0g）中			
ニンジン	2.4g	ヨクイニン	4.0g
キキョウ	1.6g	サンヤク	2.4g
ヘンズ	1.6g	シュクシャ	1.6g
レンニク	1.6g	カンゾウ	1.2g
ブクリョウ	3.2g		

より抽出した水製エキス3.9gを含有しています。

添加物として含水二酸化ケイ素、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプンを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (6)使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。
- (7)箱の「開封年月日」記入欄に、箱を開封した日付を記入してください。



本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることがあります。品質・効果に変わりはありません。

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106
受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
フリーダイヤル0120(149)931

製造販売元 **小太郎漢方製薬株式会社**
〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号