

リクトール顆粒

⚠️ 『使用上の注意』

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

≪効能・効果≫

体力中等度以下で、胃腸が弱く、全身倦怠感があり、口や舌が乾き、尿が出しづるものの次の諸症：残尿感、頻尿、排尿痛、尿のにごり、排尿困難、こしけ（おりもの）

≪用法・用量≫

次の量を1日3回食前又は食間に、水又は白湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1包	3回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	
4歳未満2歳以上	1/3包	
2歳未満	1/4包以下	

≪用法・用量に関連する注意≫

1. 定められた用法・用量を厳守してください。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
3. 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

《成分・分量》 1日量3包(6g)中

下記生薬より得た清心蓮子飲エキス粉末4500mgを含む。

レンニク	3.5g	オウゴン	2.1g
バクモンドウ	2.1g	オウギ	2.8g
ブクリョウ	2.8g	ジコッピ	2.1g
ニンジン	3.5g	カンゾウ	0.7g
シャゼンシ	2.1g		

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、二酸化ケイ素を含有する。

《保管及び取扱上の注意》

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
4. 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
5. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは下記にお願い申し上げます。

OJAS PHARMA株式会社「消費者相談窓口」

〒637-0014 奈良県五條市住川町1321

電話 (0747) 23-2424

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 **OJAS PHARMA株式会社**
奈良県五條市住川町1321