

効能・効果

体力中等度で、せきが続く、たんが多くて切れにくいもの次の諸症：たんの多く出るせき、気管支炎

用法・用量

大人(15才以上)1回1包、1日2回食前又は食間に水又はお湯で服用してください(15才未満は服用しないこと)

〈用法・用量に関連する注意〉
定められた用法・用量を厳守すること

●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます

保管及び取扱い上の注意

- 1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
- 2) 小児の手の届かない所に保管すること
- 3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

副作用被害救済制度
☎0120-149-931



依力中程度で、せきが続く、たんが多くて切れにくいもの次の諸症：たんの多く出るせき、気管支炎

清肺湯せいはいとう顆粒

ダズモックEX

ダメージを受けた気管支をキレイにし



エキス量

+

清涼感

UP!

(ダズモックαとの比較)

しつこくつらい咳、たん、気管支炎を改善

1日2回で効く

第2類医薬品



タバコ・排気ガスなどでせき、たん、息苦しさが続く方に

特徴

タバコや排気ガスなどで、せき・たん・息苦しさが続く方のお薬です

漢方処方「清肺湯(せいはいとう)」がダメージを受けた気管支粘膜の汚れを取り除きながら、せき・たん・気管支炎を改善します

ダズモックαに比べ、エキス量、清涼感を高めたEX処方です

気管支の状態を正常に近づけ、呼吸をラクにしていきます

成分・分量

1日量(2包：7.6g)中
清肺湯エキス4.48g

オウゴン	1.4g
キキョウ	1.4g
ソウハクヒ	1.4g
キョウニン	1.4g
サンシシ	1.4g
テンモンドウ	1.4g
パイモ	1.4g
チンピ	1.4g
タイソウ	1.4g
チクジョ	1.4g
フクリョウ	2.1g
トウキ	2.1g
バクモンドウ	2.1g
ゴモシ	0.35g
ショウキョウ	0.35g
カンソウ	0.7g
より抽出	
(添加物：デキストリンを含む)	

添加物として、乳糖、二酸化ケイ素、ステアリン酸 Mg、無水ケイ酸トメントール、プロレングリコール、セルロースを含有する

●本剤は天然物(生薬)を用いているため、顆粒の色が多少異なることがあります

漢方製剤

販売名：ダズモックEX
Medicine for Cough and Bronchitis

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

使用上の注意

■相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 胃腸の弱い人
 - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしただけでも息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄だん(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返してあらわれる

3. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

あつたらいいな/をカタチにする

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお伺いいたします

製造販売元 小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-10-3

10193767

MADE IN JAPAN



第2類医薬品

押して開ける