

第2類医薬品

ご使用に際してはこの説明書を必ずお読み下さい。
また、必要などきに読めるよう大切に保管して下さい。

◆角野の漢方製剤

角野の疎経活血湯

角野の疎経活血湯は漢方処方に従って、生薬を配合して製した煎剤で、特異な芳香があります。



〈使用上の注意〉

⊗ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)
- 次の人には服用しないこと
 - 生後3ヶ月未満の乳児
 - 長期連用しないこと



相談すること

- 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる婦人。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 高齢者。
 - 今まで薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - むくみのある人。
 - 高血圧、心臓病または腎臓病で診断を受けた人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛があらわれる。

- (2) 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合

効能・効果

関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛

用法・用量

本品1包を和紙袋入りのまま、水約500mlを加えて、半量ぐらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、煎液を3回に分けて、1日に3回食前または食間に服用する。

小児は、同様に煎じ

15歳未満7才以上	大人の2/3
7歳未満4才以上	大人の1/2
4歳未満2才以上	大人の1/3
2歳未満	大人の1/4以下を服用する。

服用に際して、次のことに注意すること

- 1) 定められた用法・用量を厳守すること。
- 2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本品 1日量(1包) 28.5g中

トウキ	2.0g
ジオウ	2.0g
センキュウ	2.0g
ビャクジュツ	2.0g
ブクリョウ	2.0g
トウニン	2.0g
シャクヤク	2.5g
ゴシツ	1.5g
ボウイ	1.5g
ボウフウ	1.5g
リュウタン	1.5g
ショウキョウ	1.5g
チンピ	1.5g
ビャクシ	1.0g
カンゾウ	1.0g
イレイセン	1.5g
キョウカツ	1.5g

保管及び取り扱い上の注意

- 1) 直射日光の当たらない(湿気の少ない)涼しいところに(密栓して)保管すること。
- 2) 小児の手の届かないところに保管すること。

お問い合わせ先

本製品に対するお問い合わせは、下記をお願いします。

有限会社 角野製薬所 Tel. 0994-58-7978

受付時間 月曜日を除く午後1時から6時まで

製造販売元 有限会社 角野製薬所

〒893-1101 鹿児島県鹿屋市吾平町上名5756

角野の疎経活血湯

第2類医薬品

製造販売元

有限会社

角野製薬所

鹿児島県鹿屋市吾平町上名五七五六

電話（〇九九四）五八一七九七八

成分および分量または本質

1日量1包28.5g中

日本薬局方	トウキ	2.0g
"	ジオウ	2.0g
"	センキュウ	2.0g
"	ビャクジュツ	2.0g
"	ブクリョウ	2.0g
"	トウニン	2.0g
"	シャクヤク	2.5g
"	ゴシツ	1.5g
"	ボウイ	1.5g
"	ボウフウ	1.5g
"	リュウタン	1.5g
"	ショウキョウ	1.5g
"	チンピ	1.5g
"	ビャクシ	1.0g
"	カンゾウ	1.0g
"	イレイセン	1.5g
"	キョウカツ	1.5g

用法および用量

本品1包を和紙袋入りのまま、水約500mlを加えて、半量ぐらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、煎液を3回に分けて、1日に3回食前又は食間に服用する。

小児は同様に煎じ

15才未満7才以上	大人の2/3
7才未満4才以上	大人の1/2
4才未満2才以上	大人の1/3
2才未満	大人の1/4以下を 服用する。

効能又は効果

関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛

注意

- 1.服用に際しては、説明文をよく読むこと。
- 2.直射日光の当たらない涼しいところに保管すること。

10包 ¥3,150 (税込) LOT

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931