

持ち運びに
便利



第2類医薬品

漢方

阪本漢法の

大黃甘草湯


便秘薬

【効能・効果】

便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・
皮膚炎・ふきでもの(にきび)・食欲不振
(食欲減退)・腹部膨満・腸内異常発酵・痔
などの症状の緩和

＜効能・効果に関連する注意＞

体力に関わらず、使用できます。



服用前にこの袋の説明文書を必ずお読みください。
また、この袋を大切に保管してください。

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりと閉めください。

【販売名】 阪本漢法の漢方便秘薬

漢方製剤 第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人
(体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
消化器：はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢
4. 5~6日間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】 便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの(にきび)・食欲不振(食欲減退)・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和

<効能・効果に関連する注意> 体力に関わらず、使用できます。

【用法・用量】 次の量を1日1回、就寝前(又は空腹時)に水かお湯で、かまずに服用してください。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら1錠ずつ増量又は減量してください。


年 齢	1 回 量
成人(15歳以上)	3錠~4錠
5歳以上 15歳未満	1錠~2錠
5歳未満	服用しないでください

<用法・用量に関連する注意> (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。(2) 定められた用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】 成人1日最大服用量4錠中 日局 ダイオウ末 1,000mg、日局 カンゾウ末 250mg
添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg
※本剤は天然物(生薬)を用いていますので、錠剤の色調等が多少異なることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) ぬれた手で取り扱わないでください。(湿気は錠剤の色や形が変わる原因になります。)(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。(6) 開封後はなるべく早く使用してください。

【お客様相談室】 ☎ 06-6423-0565
(祝日を除く月~金曜日10:00~17:00)

【製造販売元】  株式会社 阪本漢法製薬
兵庫県尼崎市名神町1-5-12

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931