

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください  
また、必要時に読めるよう大切に保管しておいてください

第2類医薬品 漢方便秘薬（錠剤）

# 大黃甘草湯エキス錠



## 使用上の注意

### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと  
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
  - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
  - (5) 高齢者。
  - (6) 次の症状のある人。 むくみ
  - (7) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
下痢
4. 5～6日間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 〔効能・効果〕

便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの（にきび）・食欲不振（食欲減退）・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和

### <効能・効果に関連する注意>

体力に関わらず、使用できる。

## 〔用法・用量〕

次の量を就寝前に水でかまずに服用すること。ただし初回は最小量を用い、便通の具合や状態を見ながら、半錠ないし1錠ずつ増量（下記の最大量まで）または減量すること。

年 齢	2～3日便通がないとき (軽い便秘のとき)	4日以上便通がないとき (頑固な便秘のとき)	1日服用回数
成人（15才以上）	2錠～6錠	4錠～8錠	1回
5才以上15才未満	1錠～3錠	2錠～4錠	
5才未満	服用しないこと		

### <用法・用量に関連する注意>

5才以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

## 〔成分・分量〕 1日量8錠（1錠320mg）中

大黃甘草湯エキス…………… 1,000mg

（ダイオウ 4,000mg, カンゾウ 1,000mg より製した乾燥エキス）

添加物：乳糖，セルロース，CMC-Ca，ステアリン酸Mg，タルクを含有

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
4. ピン入りの場合は、**服用のつどフタをよくしめること。**

（ピンのフタのしめ方が不十分な場合、湿気などの影響で薬が変質することがある）。



### ◎大黃甘草湯エキス錠は以下のような症状の人におすすめします。

1. お通じが悪く、肌荒れや吹き出物に悩まされている方。
2. お通じが悪く、食欲不振や頭痛、のぼせの症状がある方。
3. 常習便秘になやまされている方。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までお願いします。

北日本製薬株式会社 〒930-0314 富山県中新川郡上市町若杉55

電話番号076-472-1011 受付時間9:00～16:30（土、日、祝日を除く）