

2013年12月改訂

# 東亜漢方便秘薬

第2類医薬品

使用上の注意



してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと  
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。  
(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
下痢
4. 5～6日間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

内容量 1000錠

副作用被害救済制度連絡先 ☎0120-149-931

【効能・効果】

便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの(にきび)・  
食欲不振(食欲減退)・腹部膨満、腸内異常醗酵、痔などの症状の緩和  
〈効能・効果に関連する注意〉  
体力に関わらず、使用できる。

【成分・分量】 1日量4錠(1錠 320mg)中

大黃甘草湯エキス・・・500mg  
(ダイオウ 2,000mg, カンゾウ 500mg より製した乾燥エキス)  
添加物:乳糖,セルロース,CMC-Ca,ステアリン酸Mg,タルクを含有

【用法・用量】

次の量を1日1回、就寝前に水でかまずに服用すること。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態を見ながら、半錠ないし1錠ずつ増量(下記の最大量まで)または減量する。

年齢	2～3日便通がないとき (軽い便秘のとき)	4日以上便通がないとき (頑固な便秘のとき)
成人(15才以上)	1錠～3錠	2錠～4錠
5才以上15才未満	半錠～1錠半	1錠～2錠
5才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

5才以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
2. 小児の手の届かないところに保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

製造販売元 北日本製薬株式会社 富山県中新川郡上市町若杉55  
問い合わせ先076-472-1011 C