

カヨイソウ

漢方製剤

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと ☒

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと 他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

相談すること ■

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人.
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人.
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人).
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人.
 - (5) 高齢者.
 - (6) 次の症状のある人. むくみ
 - (7) 次の診断を受けた人. 高血圧, 心臓病, 腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢, 腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症, ミオパチー	手足のだるさ, しびれ, つっぱり感やこわばりに加えて, 脱力感, 筋肉痛があらわれ, 徐々に強くなる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢
4. 5～6日間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効 能・効 果】

便秘,便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの(にきび)・食欲不振(食欲減退)・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和

<効能・効果に関連する注意> 体力に関わらず、使用できる。

【用 法・用 量】

次の量を1日1回、就寝前に水でかまずに服用すること。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態を見ながら、半錠ないし1錠ずつ増量(下記の最大量まで)または減量する。

年 齢	2～3日便通がないとき (軽い便秘のとき)	4日以上便通がないとき (頑固な便秘のとき)	1日服用回数
成人(15才以上)	2錠～6錠	4錠～8錠	1 回
5才以上15才未満	1錠～3錠	2錠～4錠	
5才未満	服用しないこと		

<用法・用量に関連する注意>

5才以上の幼小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成 分・分 量】1日量(8錠)中

大黄甘草湯エキス・・・1000mg

(ダイオウ 4000mg, カンゾウ 1000mgより製した乾燥エキス)

添加物:乳糖,セルロース,CMC-Ca,ステアリン酸Mg,タルクを含有

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かないところに保管すること。



箱

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元 北日本製薬株式会社 富山県中新川郡上市町若杉55 問い合わせ先 076-472-1011