

タキザワの

漢方煎薬

第2類医薬品

5日分10包  
33

大黃牡丹皮湯「タキザワ」



株式会社タキザワ漢方廠



(\*)：2010年03月改訂

# 漢方薬 大黃牡丹皮湯「タキザワ」

第2類医薬品

10C

## ⚠️<使用上の注意>

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。  
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



### ■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
  - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師又は薬剤師に相談してください。
  - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

- (2) 1ヵ月位(便秘、痔疾に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。  
下痢

### 【成分・分量】

ダイオウ	2.0g	乾燥硫酸ナトリウム	2.0g
ポタンビ	4.0g	トウガシ	6.0g
トウニン	4.0g		

1日分(1包9.0g×2) 18.0g

### 【効能・効果】

体力中等度以上で、下腹部痛があって、便秘しがちなものの次の諸症：月経不順、月経困難、月経痛、便秘、痔疾(\*)

### 【用法・用量】

1日2回朝夕の空腹時に、本品1包(1回分)を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて半量ぐらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、次の量を服用してください。

年 齢	1 回 量
大人(15歳以上)	全 量
15歳未満7歳以上	大人の2/3
7歳未満	服用しないこと

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



4 974961 110220



製造販売元  
株式会社 タキザワ漢方薬  
さいたま市見沼区片柳412-1  
お客様相談室 ☎048-688-7923  
受付時間：9時～18時(月～金)

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
☎ 0120-149-931