

肥満症／胃炎／神経症



# 大柴胡湯

第2類医薬品

126錠

14日分

販売名：大柴胡湯エキス錠OM

体力が充実して、脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しく、  
便秘の傾向があるものの次の諸症：

胃炎、常習便秘、高血圧や肥満に伴う肩こり・頭痛・便秘、神経症、肥満症

1回3錠 / 1日3回

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。又、必要な時に読めるよう大切に保管してください

販売名：大柴胡湯エキス錠OM 第2類医薬品 126錠

**▲ 使用上の注意**

☒ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと 他の瀉下薬 (下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

**相談すること** 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人)。(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。(5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状	まれに右記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診察を受けること	症状の名称	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ		間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
消化器	激しい腹痛を伴う下痢、腹痛		肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸 (皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢
4. 1ヵ月位 (常習便秘、高血圧や肥満に伴う便秘に服用する場合には5～6日間) 服用しても症状がよくなりません場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**【効能又は効果】** 体力が充実して、脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しく、便秘の傾向があるものの次の諸症：胃炎、常習便秘、高血圧や肥満に伴う肩こり・頭痛・便秘、神経症、肥満症

**【用法及び用量】** 次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。

成人 (15歳以上) 1回3錠、15歳未満5歳以上1回2錠、5歳未満は服用しないこと

<用法及び用量に関連する注意> (1) 用法・用量を厳守してください。(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

**【成分及び分量】** 大柴胡湯エキス錠OMの1日量 (9錠) 中には大柴胡湯エキス (1/2量) 2050mgを含む。(サイコ 3.0g、ハンゲ 2.0g、ショウキョウ・ダイオウ 各 0.5g、オウゴン・シャクヤク・タイソウ 各 1.5g、キジツ 1.0gより抽出)

添加物として、CMC-Ca、グロス CMC-Na、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメロース、酸化チタン、タルク、マクロゴール、カラメル、カルナバロウを含有する。

**【保管及び取扱い上の注意】** (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをしかりしめて保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。(5) 水分が錠剤につきまると、変色又は色むらを生じることがありますので、水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。



製造販売元 大峰堂薬品工業株式会社

奈良県大和高田市根成柿574

お問い合わせ先 消費者相談窓口 電話：0745-22-3601

受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

製造番号

使用期限

副作用被害救済制度  
0120-149-931

TE-1

