

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。  
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

T-144B

第2類医薬品

だいさいこうとう

# 大柴胡湯エキス顆粒KM

## ⚠ 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと  
生後3ヵ月未満の乳児。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと  
他の瀉下薬（下剤）
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。  
(4)胃腸が弱く下痢しやすい人。  
(5)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間 質 性 肺 炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝 機 能 障 害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
下痢
4. 1ヵ月位（常習便秘、高血圧や肥満に伴う便秘に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 〔効能又は効果〕

体力が充実して、脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しく、便秘の傾向があるものの次の諸症：胃炎、常習便秘、高血圧や肥満に伴う肩こり・頭痛・便秘、神経症、肥満症

### 〔用法及び用量〕

食前又は食間に服用する。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人（15歳以上）	2.5 g	3 回
小児 15歳未満 7 歳以上	1.6 g（約2/3匙）	
7 歳未満 4 歳以上	1.2 g（約1/2匙）	
4 歳未満 2 歳以上	0.8 g（約1/3匙）	
2 歳未満	0.6 g（約1/4匙）以下	

### 〔用法及び用量に関連する注意〕

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2)1 歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させること。

### 〔成分及び分量〕 1 日量(7.5 g)中

大柴胡湯エキス		3.50 g
〔 日本薬局方 サイコ		6.0 g 〕
〔 日本薬局方 ハンゲ		4.0 g 〕
〔 日本薬局方 オウゴン		3.0 g 〕
〔 日本薬局方 シャクヤク		3.0 g 〕
〔 日本薬局方 タイソウ		3.0 g 〕
〔 日本薬局方 キジツ		2.0 g 〕
〔 日本薬局方 ダイオウ		2.0 g 〕
〔 日本薬局方 ショウキョウ		1.5 g 〕

添加物として、乳糖、ステアリン酸マグネシウムを含有する。

- 本剤は天然の生薬から有効成分を抽出した製剤ですので、製品により顆粒剤の色・風味が若干異なることがありますが、薬効には変わりありません。

### 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

### 〔お問い合わせ先〕

一元製薬株式会社「お客様相談室」  
〒171-0043 東京都豊島区要町3-4-10  
電話：03-3973-2917

○受付時間：9:00～17:00（土、日、祝祭日を除く）

発売元 **一元製薬株式会社**  
東京都豊島区要町3-4-10

製造販売元 **北日本製薬株式会社**  
（輸入元） 富山県中新川郡上市町若杉55