

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ側面に記載)を過ぎた製品は服用しないこと

肩がこって
長引く頭痛に

血流を改善して治す

漢方ズッキノン[®]
11種類の生薬からなる漢方処方

販売名:ズッキノン

漢方製剤 **顆粒** 第2類医薬品

製品特徴

- 肩がこって頭痛が長引いたり、ぶり返すときの漢方薬です
- 11種類の生薬からなる漢方処方が、肩・首の筋肉緊張をやわらげ、血流を整えながら、しつこい頭痛を治していきます

頭痛を長引かせないために

一般的によく起きる頭痛(緊張型頭痛)は、肩こりから上半身の筋肉が緊張し、こめかみや後頭部を締め付けるために起こります。このような頭痛は肩こりのある方で長引きやすく、鎮痛薬を飲んでもぶり返すことがあるため、肩こりや血行不良などの不調もあわせてケアしておくことが重要です



イメージ図

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
 - (3) 胃腸虚弱で冷え症の人
 - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみなどを起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

3. 1ヶ月くらい服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

効能・効果

体力中等度で、慢性に経過する頭痛、肩こり、めまいなどがあるものの次の諸症：
慢性頭痛、神経症、高血圧の傾向のあるもの

用法・用量

次の量を食前または食間に水またはお湯で服用してください

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1包	2回
15才未満	× 服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

定められた用法・用量を厳守すること

●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます

成分・分量

1日量(2包:4.4g)中 釣藤散エキス(1/2量)……2.5g

<原生薬換算量>

チョウトウコウ…1.5g	チンピ……………1.5g	ハンゲ……………1.5g
バクモンドウ…1.5g	ブクリョウ………1.5g	ニンジン……………1.0g
ボウフウ………1.0g	キクカ……………1.0g	カンゾウ……………0.5g
ショウキョウ…0.5g	セッコウ……………2.5g	

添加物として、ケイ酸Al、ステアリン酸Mg、乳糖を含有する

●本剤は天然物(生薬)を用いているため、顆粒の色が多少異なることがあります

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管すること
- (2)小児の手の届かないところに保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

 発売元
小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先(お客様相談室)
☎0120-5884-01
受付時間9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元
小林製薬株式会社
〒567-0057大阪府茨木市豊川1-30-3

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ底面に記載)を過ぎた製品は服用しないこと



販売名:ズッキノン

漢方製剤 **顆粒** 第2類医薬品

製品特徴

- マスクを長時間つけるとのぼせる頭痛がしたり、肩がこる方におすすめです
- マスクなどによるつらい頭痛を抑えたい時にお飲みください
- 漢方処方「釣藤散(ちょうとうさん)」が、酸素を運ぶ力を高め、めまいや肩こりなどを伴う頭痛を改善します

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 胃腸虚弱で冷え症の人
 - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

3. 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(裏面につづく)

効能・効果

体力中等度で、慢性に経過する頭痛、めまい、肩こりなどがあるものの次の諸症：
慢性頭痛、神経症、高血圧の傾向のあるもの

用法・用量

次の量を食前又は食間に水又はお湯で服用してください

年齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	1包	1日2回
15才未満	× 服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

定められた用法・用量を厳守すること

- 食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます

成分・分量 1日量(2包:4.4g)中

釣藤散エキス(1/2量)・・・2.5g

チョウトウコウ・・・1.5g	チンピ・・・1.5g	ハンゲ・・・1.5g
バクモンドウ・・・1.5g	ブクリョウ・・・1.5g	ニンジン・・・1.0g
ボウフウ・・・1.0g	キクカ・・・1.0g	カンゾウ・・・0.5g
ショウキョウ・・・0.5g	セッコウ・・・2.5g	より抽出

添加物として、ケイ酸Al、ステアリン酸Mg、乳糖を含有する

- 本剤は天然物(生薬)を用いているため、顆粒の色が多少異なることがあります

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社**
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **小林製薬株式会社**
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3