

開け口

開け口

尿が出にくい方に 排尿痛・残尿感・頻尿

# 猪 苓 湯

ちょ れい とう

## 効能・効果

体力に関わらず使用でき、排尿異常があり、ときに口が渇くものの次の諸症：  
排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿、むくみ

## 成分・分量

12錠中 猪苓湯乾燥エキス1.56gを含有しています。

日局チョレイ……………	1.8g	日局ブリョウ……………	1.8g
日局カッセキ……………	1.8g	日局タクシャ……………	1.8g
アキョウ……………	1.8g		

上記生薬量に相当します

添加物：無水ケイ酸、ケイ酸Al、CMC-Ca、セルロース、トウモロコシデンプン、ステアリン酸Mg、乳糖水和物

## 用法・用量

次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人(15才以上)	4錠	3回
7才以上15才未満	3錠	
5才以上7才未満	2錠	
5才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)食間とは食後2～3時間を指します。

第2類医薬品 **36錠**

開け口

開け口

## 吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりとしめること

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください。使用期限(パッケージ側面及びパウチ下部に記載)を過ぎた製品は服用しないこと

販売名：JPS 猪苓湯エキス錠 N

漢方製剤 第2類医薬品

## 使用上の注意

### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明書きを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書きを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをよく閉めて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を原料として使用していますので、製品により色調等が異なる場合がありますが、効能・効果には変わりありません。
- (5)本剤をぬれた手で扱わないでください。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じることがあります。

(上段)使用期限(西暦年、月)/(下段)製造番号

ジェーピーエス製薬株式会社  
 製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1  
 発 売 元 横浜市都筑区東山田4-42-22  
**お客様相談室 ☎045-593-2136**



副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

R1-19091

..