

【漢方薬】

チョコレートシソワ

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

体力に関わらず使用でき、排尿異常があり、ときに口が渴^{かわ}くものの次の諸症：排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿、むくみ

用法・用量

次の量を食間^注)に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用してください。

注)「食間」とは食後2～3時間を指します。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人(15歳以上)	6錠	3回
15歳未満 7歳以上	4錠	
7歳未満 5歳以上	3錠	
5歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

本剤18錠(3.6g)中

カ ッ セ キ ……1.5g	} 猪苓湯エキス ……1.6g
ゼ ラ チ ン ……1.5g	
タ ク シ ャ ……1.5g	
チ ョ レ イ ……1.5g	
ブ ク リ ョ ウ ……1.5g	

添加物として含水二酸化ケイ素、クロスカルメロースナトリウム、クロスポリドン、ステアリン酸マグネシウム、バレイショデンプンを含有します。

- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、下記をお願いします。

伸和製薬株式会社 情報管理室

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町13-4

電話：0120-019-776

受付時間：9時から17時まで

(土・日曜、祝日を除く)

発売元

伸和製薬株式会社

東京都中央区日本橋小伝馬町13-4

製造販売元

剂盛堂薬品株式会社

和歌山市太田二丁目8番31号

