

生理前^{などに}便秘^がつらい方に



5日分
(15才以上)
40錠

開け口

開け口

生理前^{などの}
腸不調に
タメルナ

Tameluna



ホルモン変化で乱れがちな腸のリズムを整えて

便の溜め込みを抑えていく

販売名：ホワイトルナ 桃核承気湯錠

【効能・効果】 体力中等度以上で、のぼせて便秘しがちなものの次の諸症：月経不順、月経困難症、月経痛、月経時や産後の精神不安、腰痛、便秘、高血圧の随伴症状（頭痛、めまい、肩こり）、痔疾、打撲症

【成分・分量】 1日量(8錠)中 桃核承気湯エキス(3/5量)1584mg

トウニン…3.0g、ケイヒ…2.4g、ダイオウ…1.8g、カンゾウ…0.9g、
無水ボウショウ…0.6g より抽出(添加物：無水ケイ酸を含む)

添加物として、二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg、タルク、セルロースを含有する

●本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります



小林製薬

40錠 第2類医薬品

生理前などの

腸不調にタメルナ

開け口

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりしめること

開け口

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください。使用期限(パウチ下部に記載)を過ぎた製品は服用しないこと

← チャック

販売名: ホワイトルナ 桃核承気湯錠

漢方製剤 第2類医薬品

△ 使用上の注意

⊗ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと: 他の瀉下薬(下剤)

2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけること

■ **相談すること** 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人 (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること: 下痢

4. 1ヶ月位(便秘に服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

5. 本剤の服用により、予期しない出血があらわれた場合には、服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法・用量 大人(15才以上)1回4錠、1日2回食前又は食間に水又はお湯で服用してください(15才未満は服用しないこと)

(用法・用量に関する注意)定められた用法・用量を厳守すること

●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2~3時間のことをいいます

保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをしっかりしめて保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと (誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 本剤をぬれた手で扱わないこと

— 製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお問い合わせください —

発売元 **小林製薬株式会社** 製造販売元 **大峰堂薬品工業株式会社**
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10 〒635-0051 奈良県大和高田市根成柿574

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

MADE IN JAPAN
10187157



使用期限
(西暦年、月)

製造番号