



中国の民間説話「白蛇伝」
に登場する女性を伝統的な
漢方のイメージとしてシンボルマークとしたものです。

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

トーキイン®「コタロー」

(当帰飲子エキス錠)

商品番号

S195

本剤は、漢方の古典「済生方」収載の処方にもとづいてつくられたエキスを、飲みやすく錠剤としたものです。

老年になると皮膚が乾燥気味になって、かゆみを訴えることがよくあります。

また、老齢の方でなくとも空気が冷えて乾燥してくる季節、皮膚がカサカサした傾向になったり、かゆみに悩まされる方も近年増えています。

これらは漢方では血虚（滋潤・栄養のはたらきをする血の不足）に伴って起こっていると考えますが、トーキインは分泌物の少ない湿疹、かゆみをおさえるお薬です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

下痢

4. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

【効能・効果】

冷え症のものの次の諸症：

慢性湿疹（分泌物の少ないもの）、かゆみ。

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。
食間とは……食後2~3時間を指します。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	4錠	3回
15歳未満7歳以上	3錠	
7歳未満5歳以上	2錠	
5歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。


【成分・分量】

成分・分量（本剤12錠中）					
トウキ	2.5 g	ボウフウ	1.5 g	オウギ	1.0 g
シャクヤク	1.5 g	ジオウ	2.0 g	カシュウ	1.25 g
センキュウ	1.5 g	ケイガイ	1.0 g	カンゾウ	0.5 g
シツリシ	1.5 g				
より抽出した水製エキス3.00 gを含有しています。					

添加物として酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム、タルク、ヒプロメロース、粉末飴、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、カラメル、カルナウバロウ、サラシミツロウを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)ぬれた手や湿気を帯びた手で取り扱わないでください。水分は錠剤の色や形が変わる原因になります。
- (5)ビンのフタのしめ方が不十分な場合、湿気等の影響で錠剤の品質が変わることがありますので、服用のつどフタをよくしめてください。
- (6)ビンの中の詰めものは、フタを開けた後はすぐてください。
(詰めものは、輸送中に錠剤が破損することを防ぐためのもので、再使用されると異物の混入や湿気により品質が変わる原因になります)
- (7)使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。
- (8)箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。



商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

®登録商標

製造販売元



漢方をよりよく より多くの人に
小太郎漢方製薬株式会社
〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号
TEL 06 (6371) 9106