

BORRA[®]

内服

第2類医薬品

ボラギノール[®]

当帰建中湯

BORRAGINOL TOKIKENCHUTO ORAL is for hemorrhoidal relief containing 6 types of crude drug extract.

痔を内側から改善

漢方薬

第2類医薬品

内服

ボラギノール[®]

当帰建中湯

効能・効果

体力虚弱で、疲労しやすく血色のすぐれないものの次の諸症：月経痛、月経困難症、月経不順、腹痛、下腹部痛、腰痛、痔、脱肛の痛み、病後・術後の体力低下

成分・分量

本品1日量〔3包(1包1.5g)〕中
当帰建中湯エキス粉末2800mg

| | |
|-------------|------|
| 〔日局〕 トウキ | 2.0g |
| 〔日局〕 ケイヒ | 2.0g |
| 〔日局〕 ショウキョウ | 0.5g |
| 〔日局〕 タイソウ | 2.0g |
| 〔日局〕 シャクヤク | 2.5g |
| 〔日局〕 カンゾウ | 1.0g |

より抽出

添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、二酸化ケイ素

【お問い合わせ先】

天藤製薬株式会社 お客様相談係

〒560-0082

大阪府豊中市新千里東町一丁目5番3号

☎0120-932-904

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土、日、休、祝日を除く)

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

外箱が開いていたり、中の包装が破れている等、
開封された形跡がある場合は使用しないでください

押してあける

痔の痛みに のんで効く薬です。

- つらい痛みを今すぐおさえたい
- いぼ痔を内側から対処したい
- 飲み薬で対処したい

⚠ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 胃腸の弱い人。(4) 高齢者。(5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(6) 次の症状のある人。むくみ(7) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称 | 症状 |
|---------------------|---|
| 偽アルドステロン症、 ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

- 1ヵ月位(下腹部痛、痔、脱肛の痛みに服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

内服 第2類医薬品 ボラギノール®当帰建中湯

用法・用量

次の量を食前または食間に水または白湯で服用すること。(食間とは、食後2~3時間を指します。)

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|---------------|---------|--------|
| 成人 (15歳以上) | 1包 | 3回 |
| 15歳未満7歳以上 | 2/3包 | |
| 7歳未満4歳以上 | 1/2包 | |
| 4歳未満 | 服用しないこと | |

<用法・用量に関連する注意>

- 用法・用量を厳守すること。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり、品質が変わることがある)。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- 1包を分割したり残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。
- 本剤は天然物を原料としているため、色調、味又は香り等に多少の差異が出るがありますが、効果には変わりありません。



製造販売元

天藤製薬株式会社

大阪府豊中市新千里東町一丁目5番3号